

farinoso-canescens et ad nervum medium pilis nigricantibus basi dilatatis longiuscule ciliata, interiora linear-lanceolata subobtusa pube farinoso canescentia; receptaculum areolatum nudum; ligulae flavae concolores 10 : 2 mm longae latae; styli lutei, achaenia brunnea conformia compresso-subprismatica tenuiter 30-striata apice non attenuata, basi truncata, 5 $\frac{1}{2}$ mm longa, pappus niveus fragilis tenuiter pilosus 8 mm longus involucrum superans. — Hab. in subhumidis jugi Zygos substratu silicico-serpentino. — Secundum Flor. or. in sect. *Eucrepis* *Praemorsae Elatae* prope *C. willemetoidem* Boiss. collocanda.

Crepis Columnae Froel. in alpinis m. Karava, in jugo Zygos.

C. pulchra L. in arvis neglectis pr. Pharsalum. — **Var. β . adenocladia** Hskn., caulis scabriuscus inferne crispule-puberulus, caeterum ad inflorescentiam usque dense glandulosus, pedunculi in parte superiore tantum glabri; folia basilaria subintegra ex apice dilatato valde rotundato sensim in petiolum angustata, in parte media inferiore leviter repanda, utrinque glanduloso-pilosa; achaenia interiora scabriuscula nec laevia; hab. in dumetis saxosis supra Kalabaka Th. pr. mon. Meteora. — Eandem varietatem in Syria bor. pr. Aintab et pr. Biredjik legi.

C. bulbosa Tsch. in maritimis Att. ad Phalerum, Laurion, Naupliam, Korinthum.

C. rubra L. in m. Palamidi supra Naupliam, in Th. pr. Pharsalum, Aivali, Orman Magula.

C. glandulosa Guss. ind. sem. h. b. (1825) in Att. et Th. collibus et agris frequ. — Multum variat: a) *simplex*, caulis simplex erectus strictus crassiuseulus in parte inferiore saepe rubicundo dense pilis crispulis longis albido, in parte superiore praeterea pilis glanduliferis brevioribus intermixtis obsitus, ramulis abbreviatis inflorescentiam confertam subcorymbosam formantibus, folia oblongo-lanceolata repando-dentata vel ad basin incisa, involuci cani phylla pilis glanduliferis longioribus et brevioribus dense obsita; hab. ad vias, in agris inter Athenas et Phalerum. Eadem forma caule mono- vel oligocephalo, foliis integris breviter denticulatis reperitur. — b) *interrupta* S. S. (pr. sp.), caules solitarii vel plures arcuato-adscendententes tenuiores humiles, a collo ramosi, exasperati sparse glanduloso-pilosi; folia pinnatifida v. runcinato-pinnatifida lobo terminali latiore triangulari; involuci phylla pilis majoribus et minoribus glanduliferis obsita; hab. in collibus aridis Lycabetti, ad akropolin Athenarum. — c) *eglandulosa* (Barkh. *Zacynthia Marg.* & *Reut.*, *B. Byzantina DC.*), involuci phylla pilis longis hispidis eglandulosis dense obsita; hab. in herbidis m. Palamidi supra Naupliam. Formam involuero subglanduloso in paenins. Methana legi. —