

(5.) *Crepis tenuifolia* Willd. *Barkhausia tenuifolia* DC. VII. p. 155 *Youngia diversifolia* Ledeb. in Walp. Rep. VI. p. 361. Glabra. Caulis 2-3-pedalis paniculato-corymbosus. Folia oblonga pinnatifida lobis angustis, superiora linearia. Capitula mediocria ad apices ramorum approximata. Phyllaria interiora 8-10 oblonga obtusa dorso pubescentia et sæpe infra apices corniculata. Achænia subteretia striata breviter rostrata. Pappus albidus aut paullum sordidus.

*Hab.* In Tibet occidentali (i. e. Kashmir boreali) ad 12,000-15,000 ped. alt. leg. T. Thoms.

*Distributio.* In Mongolia, Dauria et Sibiria.

(6.) *Crepis flexuosa* i. e. *Barkhausia flexuosa* DC. VII. p. 156 *Youngia flexuosa* Ledeb. in Walp. Rep. VI. p. 361 *Youngia glauca* Edgw. in Walp. Rep. VI. p. 360.

Glabra. Rami ramosi flexuosi. Folia radicalia oblonga pinnatifida aut dentata, caulina linearia integra. Capitula mediocria aut minuscula, sparsa. Phyllaria interiora 6-8 linearia-oblonga imberbia. Achænia anguste cylindrica subteretia striata, glabra minutissime puncticulata, apice constricta vix rostrata. Pappus tenuis albus.

*Hab.* In Himalaya boreali-occidentali ad 8,000-18,000 ped. alt. leg. (in Oct.) T. Thoms. et Dr. Stoliczka.

*Distributio.* In Sibiria Altaica.

(7.) *Crepis fuscipappa* i. e. *Youngia fuscipappa* Thwaites C. P. 1748.

Glabra aut fere glabra. Caulis 1-3-pedalis erectus subsimplex parum foliosus apice anguste corymbosus. Folia infima elongato-oblonga pinnatifida aut dentata subruncinata, caulina linearia integra aut parum dentata. Capitula ad apices ramorum approximata minuscula. Phyllaria 6-8 anguste oblonga haud acuta. Achænia cylindrica striata subglabra teretia apice contracta haud rostrata. Pappus tenuis cyaneus aut luridus.

*Hab.* In Zeylania in montibus mens. Aprili-Maio florens. In Khasia ad 3,000-5,000 ped. alt. et in vicinis terris Assamiæ : mens. April-Jun. florens.

(8.) *Crepis gracilis* Hook. f. et. Th. in Herb. etiam ex Bth. sub nomine *Youngia gracili* distributa.

Fere glabra. Caulis 1-3-pedalis erectus subsimplex. Folia cau-

lina late lanceolata utrinque acuminata, dentata aut sinuato-subpinnatifida. Capitula minuscula sparsa. Phyllaria 6-8 anguste oblonga haud acuta. Achænia teretia striata glabra apice angustata haud rostrata. Pappus sordidus aut luridus subcyaneus.

*Hab.* In Sikkim ad 8,000-13,000 ped. alt. leg. J. D. Hook.

(9.) *Crepis glomerata* Decne in Walp. Rep. II. p. 691 *Crepis depressa* Hook. f. et Th. in Herb.

Rhizoma crassum. Acaulis. Folia rotunda, basi sæpe cordata, longe petiolata, integra aut denticulata, carnosula pubescenti-scabra petiolis basi dilatatis membranaceis ciliatis. Capitula c. 10. sessilia fastigiata, mediocria. Phyllaria 6-8 elliptico-oblonga obtusa glabra marginibus membranacea. Achænia anguste cylindrica teretia striata, glabra aut minute scabrida, sursum attenuata haud rostrata. Pappus tenuis albidus.

*Hab.* In Sikkim ad 15,000-17,000 ped. alt. leg. J. D. Hooker et sub nomine *Crepide depressa* misit.

(10.) *Crepis Hookeriana* nov. sp.

Acaulis, aut caulis fere pedalis villosulo-lanatus. Folia anguste oblonga 2-6-pollicaria petiolata pinnatifida aut sinuato-dentata, villosa, subtùs pallidiora. Capitula hemisphærice congesta: fulva lana dense obsita aut parum villosa. Phyllaria elliptica valde obtusa marginibus scariosa glabra aut dorso scabride hirta. Achænia cylindrica, sursum vix attenuata, obscure striata. Pappus in sicco rufus aut cærulescens, intense coloratus luridus.

*Hab.* In Sikkim ad 13,000-17,000 ped. alt. leg. J. D. Hooker et T. Anderson. A horto Kewensi sub nomine *Crepide glomerata* Decne a cl. Hook. f. dimissa.

(11.) *Crepis Stoliczkae* in Herb. Kurz.

Scaposa undique villosula. Folia petiolata spathulato-oblonga sinuato dentata. Scapus 4-8-pollicaris apice corymbo dense adgregato terminatus. Capitula minuscula. Phyllaria (villosa) 8-10 anguste oblonga acuta, bracteolis paucis linearibus basi adjectis. Achænia anguste cylindrica striata teretia glabra apice elongata parum attenuata. Pappus tenuis albidus.

*Hab.* In Lahul, in Kashmir boreali, ad 9,500-13,500 ped. alt. mense Junio florentem leg. Dr. Stoliczka.

Quasi *Crepidis præmorsæ* Fræel. forma alpina: cf. *Crepidem* multi caulem Ledeb. speciem mihi ignotam.