

barajan los caracteres diferenciales expuestos y hasta ellas mismas pueden crecer en compañía.

No podrá ser *Scorç. graminifolia* de Linné, como supuso Boissier (l. c.) y admitió Willkomm (*Prodr.* II, p. 224), porque a esta especie Linné la dió con hojas, líneo-ensiformes (*Sp. pl.* p. 791). Se trata de la verdadera *Sc. angustifolia* L., que en España recogió Loeffling en las cercanías de Madrid, que Linné describió, que trae «hojas alesnadas» y que, además, escribió en seco Linné «*Habitat in Hispania. Loeffling*».—Loeffling decía a Linné; «*He visto una buena figura en Barrelier...*» Asso interpretó rectamente a Loeffling; fué el único autor español que le estudió; en otro país hubiera sido autoridad. Su traducción española debió de haber sido estudiada por Cutanda, que al parecer, no llegó ni a saludarla el autor de la flora matritense.

135. *Lactuca tenerrima* Pourr. *a glabra* Boiss., *Voy.*, p. 386.
—Siera Tejada.

136. *Crepis Grosii* Pau. — Castillo de Frigiliana; Sierra Tejada.

Rhizocarpica, caulis 15-20 c/m, folia basilaria, spatulata linearia, pinnatifida vel subintegra, caulina pauca bracteiformia; capitula solitaria, squamis decrescentibus, infimis parvis subulatis, mediis latioribus, internis cuspidato margine membranaceo; aqueniis periphericis longe rostratis, disci errostratis. Facies Cr. albidæ Vill.

En la única cabezuela que traía aquenios, se presentaban muy jóvenes.

137. *Andryala parviflora* Lam. var. *angustifolia* DC.; Boiss., *Voy.*, p. 394.—Sierra Tejada.

138. *Jasione montana* Boiss., *Voy.*, p. 396.—Sierra Tejada.

Mis muestras se reducen a las sumidades de las plantas; pero, se pueden apreciar los caracteres de dos formas diver-