

Rad. multicaul. Caul. subpedal. ramosi, teretes, glabri. Fol. imma sinuato-dent. villosula; summa integerr. Cal. exter. squamis adpressis, nec patulis: interior glaber, divergens. Semiflosc. multi, flavi.

*radicata*. C. fol. sinuatis, dentatis, ciliatis, radicalibus: caulibus prostratis, multifl. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Caul. semifispitham. ramosi, angulati, hispida. Fol. 3-pollic. sessilia, extrorsum latiora. Bract. ad ramorum exortum hastato-lanceol. hispida. Cal. setis nigris adpersus. Cor. flava.

(*muricata*.) C. calycibus muricatis. *Hall. hist. n. 32.*

*In Helvetia.*

Caul cubit. brachiatus, angulosus, glaber. Fol. subhirsuta, ex petiolo in ovalem bracteam dilatantur obtusam, modice serratam: caulina etiam petiolat. lanceol. prope petiolum acute, & profunde dentata; superiora semiamplexicaul. Flos parvus, flavus.

(*hamata*.) C. fol. ad terram pinnatis; superne amplexicaulibus, pinnatis, hastatis. *Hall. hist. n. 31.*

*In Helvetia.*

Planta polymorpha: alias e radice brachiata; alias recto caule ab imo ad summum ramoso. Caul. 4-pedal. angulosus, glaber, plerumq. brachiatus, & ramosus, inferne hirsutus, superne laevis. Fol. variabilia, ad terram *Taraxacum* aliquantulum imitantur laciniarum numero, & profunditate. Caulina amplexicaul. etiam hamata, longa, hastata, vel angusta, aut semipinn: vel simplicia, dentata, aut integerr. Cal. albo polline adspersus.

*Var. fol. linearibus, aut elliptico-lanceolat. integrermis: imis latioribus; superioribus angustioribus. Habitus Campanul. vulg. rotundifolia.*

*albida*. C. fol. (plerumq.) runcinato-dentatis, incanis: squamis calyc. membranaceis: flore albido. *Vill. prosp. tab. 12. f. 1. All. Fl. Ped. tab. 32. f. 3.*

*In locis saxosis montanis, apricis 24.*

Caul. pl. 2-3-chotomi; ad ramorum divisiones folium sessile. Fol. radicalia elliptica, lente in petiolum foliosum adtenuata; crassula, raro integerr. caulina semiamplexicaul. asperiora,