

(E). Mons Pantokrator, *Ph* 7276*b* (UPA). Prope pagum Nisaki, *K* 11219*b* (UPA). In ditione pagi Potamos, *K* 11224*b* (UPA). Ins. PAXOI: In ditione pagi Lakka, *Georg* 370 (UPA). In ditione pagi Gaios, *Georg* 456 (UPA).

'Ενδλάμεσου μορφά μεταξύ τῆς *Crepis neglecta* καί τῆς *Crepis hellenica*: N. PHOKIS: Oppidum Lidorikion, *K* 12430*a* (2n=8), 12632*a* (2n=8), 12631 (2n=8), 12636 (2n=8) & 12637 (2n=7) (UPA).

'Ενδλάμεσου μορφά μεταξύ τῆς *Crepis neglecta* subsp. *neglecta* καί τῆς *Crepis hellenica*: N. PIERIA: Litochoron, *R* 22551 (W). N. LARISSA: In ditione oppidi Agiã, *K* 12445 (2n=8)(UPA). Supra pagum Megalovrysi, *K* 12446*a*, 12447*a*, 12448, 12449*a* & 12450, (2n=8)(UPA). Inter Larissa et Pharsala, *R* 22979 (W). Inter Larissa et Aghia, *R* 22779(W). N. KARDITSA: Inter Kedron et Lutropigi, *R* 22895-*b* (W).

'Ενδλάμεσου μορφά μεταξύ τῆς *Crepis neglecta* subsp. *corymbosa* καί τῆς *Crepis hellenica*: Ins. ZAKYNTHOS: Supra pagum Davia, *Ph* 11196 (UPA).

2. *Crepis hellenica* Kamari, sp. nov. (ined.). Typus: Prov. Achaia, in ditione oppidi Kalavryta, ad monasterium Hagia Lavra, ca 850 m, in lapidosis, *K* 12843 (Holotypus UPA).

= *Crepis neglecta* f. *graeca* Vierh., Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 69: 266 (1919) ≡ *Crepis neglecta* subsp. *graeca* (Vierh.) Rech. fil., Ann. Naturh. Mus. (Wien) 43: 320 (1929) ≡ *Crepis neglecta* var. *graeca* (Vierh.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2: 859 (1931) ≡ *Crepis fuliginosa* var. *graeca* (Vierh.) Greuter, Boissiera 13: 157 (1967). Typus: Elis, in ruinis Olympiae, Hal a. 1911, Abb. 1 (Fig. 3) in Vierhapper l.c. (Lectotypus W-Hal).  
- *Crepis fuliginosa* vel *Crepis neglecta* f. *fuliginosa* vel *Crepis neglecta* var. *fuliginosa* auct. plur. (non *Crepis fuliginosa* Sm.).

Ic: Είκ. 3A, γ και 4.

Herba annua. Caules plerumque numerosi, ascendentes, (6) 10-25 (30) cm longi, glabri vel pubescentes vel pilosi. Folia rosularia usque ad 10 cm longa, pubescentia vel pilosa, obovato-oblongata, integerrima vel grosse dentata vel pinnatilobata in petiolum attenuata; folia caulina lineari-lanceolata, integerrima vel dentata, basi hastata, sessilia. Involucrum campanulatum (8) 9-12 (14)-phyllum, in statu fructifero (4,5)5-7 (8,5)mm longum et (2,5) 3-5 (7) mm latum; Involucris phylla glanduloso-pilosa, raro floccosa. Ligulae luteae, interdum extus purpureo-striatae. Achaenia brunnea, sulcato-striata, rostro incluso (1,5) 1,75-2,5 (3) mm longa; marginalis incurva, plerumque non rostrata; interna plerumque non rostrata vel interdum in rostrum usque ad 0,5 (1) mm longum attenuata. Pappus candidus, involucrum (0,4) 0,5-1,8 mm superans.

Numerus chromosomaticus:  $2n=6$ .

Habitat in apertis lapidosis et in arenosis a mari ad 2000 m altitudinis. Floret ab Aprili ad Junium.

Area: Hellas: Thraki (?), Macedonia austr., Thessalia austr., Sterea Hellas, Insulae Aegaeae (Euboea, Cyclades, Sporades). Bithynia (Ins. Antigoni)?.

Μονοετής, ύψους (6) 10-25 (30) εκ. Βλαστού πολυάριθμοι, λεπτού, συνήθως τοξοειδώς κεκαμμένοι, ένίοτε ίσχυρότεροι παρά τήν βάσιν, λεΐου καθ' όλον τό μήκος των ή χνωώδεις έως τριχωτού παρά τήν βάσιν, ένίοτε δέ και καθ' όλον τό μήκος των. Φύλλα βάσεως μέχρι 10 εκ. μήκους και 2 εκ. εύρους λεΐα ή τριχωτά, άντρωειδη-άντιλογχο-

ειδῆ, ἀμβλέα ἕως  $\pm$  ὀξέα, συνήθως ἀκέραια, ὀδοντωτά ἢ πτεροσχι-  
 δῶς λοβωτά, στενούμενα πρὸς πτερυγιοφόρον λοβωτόν ἢ ἀκέραιον μῦ-  
 σχον. Φύλλα βλαστοῦ λογχοειδῆ-γραμμοειδῆ, βελοειδῆ εἰς τὴν βά-  
 σιν, ἐπιφυῆ, περίβλαστα, ἀκέραια, ὀδοντωτά ἢ λοβωτά. Ποδῦσκοι  
 κεφαλίων 5-40 (60) χιλ. μήκους, εὐθεῖς, λεῖτοι ἢ μὲ ἀδενώδεις τρί-  
 χας. Περίβλημα κεφαλίου (4,5) 5-7 (8,5) χιλ. μήκους καὶ (2,5) 3  
 -5 (7) χιλ. εὗρους, κωδωνοειδές· ἀναλογία μήκους πρὸς εὗρος (1,2)  
 1,3-1,9 (2,0). Βράκτια περιβλήματος συνήθως (8) 9-12 (14), μῆ-  
 κους (4,5) 6-8 χιλ. καὶ εὗρους 0,7-1,7 (2,2) χιλ., ἐλλειψοειδῆ  
 μὲ ὀξύ ἄκρον, φέροντα μελανὰς ἢ σπανιώτερον πρασινοκιτρίνας μα-  
 κράς τρίχας, συνήθως ἀδενώδεις, ἐνίοτε λεῖα ἢ χνοώδη. Κεφάλιον  
 ἐν ἀνθήσει 10-18 (20) χιλ. διαμέτρου καὶ 6-10 (10,5) χιλ. μήκους·  
 ἀναλογία εὗρους πρὸς μῆκος (1,3) 1,4-1,9 (2,0). Στεφάνη ἀνθιδύ-  
 ου κιτρίνη, τῶν περιφερειακῶν ἀνθιδύων ἐνίοτε μὲ ἐρυθράς ραβδώ-  
 σεις ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς τῶν ἐπιφανείας. Ἀνθίδια δευτέρας σει-  
 ρᾶς μήκους 4,5-9 χιλ. μὲ εὗρος γλωσσιδίου (1,2) 1,4-2 (2,3) χιλ.,  
 ὀδόντας στεφάνης 0,2-0,5 (0,7) χιλ. μήκους, σωλήνα στεφάνης μῆ-  
 κους (1,2) 1,4-2,3 (2,6) χιλ., λεῖτον ἢ τριχωτόν, σωλήνα ἀνθῆρων  
 (1,6) 1,8-2,3 χιλ. μήκους καὶ 0,8-1,1 χιλ. εὗρους, νήματα στη-  
 μόνων μήκους (0,3) 0,5-1 χιλ. καὶ στίγματα γραμμοειδῆ (0,7) 0,9-  
 1,6 χιλ. μήκους, κίτρινα ἢ πράσινα. Ἀχαίνια καστανόχροα (1,5)  
 1,75-2,5 (3) χιλ. μήκους μὲ 10 ἀκανθωτάς ραβδώσεις· περιφερεια-  
 κά συνήθως ἄνευ ράμφους, κυρτούμενα καὶ ἐνίοτε συγκρατούμενα ὑ-  
 πό τῶν ἐσωτερικῶν βρακτίων· ἐπιδίσκια συνήθως ἄνευ ράμφους ἢ με-  
 τὰ ράμφους ἕως 0,5 (1) χιλ. μήκους. Πάππος ἀχαινίων λευκός, ὑπε-  
 ρέχων τοῦ περιβλήματος κατὰ (0,4) 0,5-1,8 χιλ.

Τὸ περιγραφόμενον ἐντάϋθα νέον εἶδος *Crepis hellenica* εἶ-

ναι τό κυριαρχοῦν εἶδος αὐτοῦ τοῦ γένους εἰς τό μεγαλύτερον μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου (Εἰκ. 5). Ἐν τούτοις, ἡ ταξινομική θέσις αὐτοῦ, ἡ ὀνοματολογία ὡς καί ἡ ἀκριβής γεωγραφική του ἐξάπλωσις διευκρινίζονται τό πρῶτον ἔνταῦθα. Εἶναι τό εἶδος, τό ὅποῖον εἰς τήν βιβλιογραφίαν ἀνεφέρετο, ἐπί τό πλεῖστον, ὡς *C. fuliginosa* ἢ ὡς κατωτέρα βαθμῆς αὐτῆς ὑπό τό ὄνομα "*graeca*".

Τόσον τά μορφολογικά ὅσον καί τά κυτταρολογικά δεδομένα ἐν-  
 ισχύουν τήν ἄποψιν ὅτι ἡ *C. hellenica* ἴσταται φυλογενετικῶς με-  
 ταξύ τῆς *C. neglecta* καί *C. cretica*. Ἀλλά τό πρόβλημα τοῦτο θά  
 μᾶς ἀπασχολήσῃ ἰδιαιτέρως εἰς τό κεφάλαιον τῆς φυλογενέσεως. Ἡ  
*C. hellenica* διαφέρει ἐκ τῶν ὑπολοίπων taxa τῆς ὁμάδος τῆς, κατ'  
 ἀρχήν ἐκ τοῦ διαφορετικοῦ ἀριθμοῦ χρωμοσωμάτων ( $2n=6$ ). Μορφολο-  
 γικῶς διακρίνεται ἐκ τῆς *C. neglecta*, κυρίως ἐκ τῶν περισσοτέ-  
 ρων καί διαχύτων βλαστῶν τῆς, καθώς καί ἐκ τῶν ἀδενωδῶν τριχῶν,  
 τὰς ὁποίας συνήθως φέρει εἰς τό περίβλημα τῶν κεφαλῶν τῆς. Ἡ  
*C. hellenica* πλησιάζει περισσότερο πρός τήν *C. cretica*. Εἰς ἀμ-  
 φότερα τά εἶδη οἱ βλαστοὶ ἔχουν τήν χαρακτηριστικὴν διάχυτον καί  
 κεκαμμένην μορφήν καθώς καί ἀδενώδεις τρίχας ἐπί τοῦ περιβλήμα-  
 τος. Τά φυτά ὅμως τῆς *C. hellenica* διακρίνονται ἐκ τῶν ἰσχυρο-  
 τέρων βλαστῶν των, τό μεγαλύτερον μέγεθος τῶν κεφαλῶν των, κα-  
 θὼς ἐπίσης ἐκ τοῦ μικροτέρου καί παχύτερου ράμφους, τό ὅποῖον  
 φέρουν τά ἀχάλνιά των.


Ἡ ἐκτεταμένη ἐξάπλωσις τοῦ εἶδους τούτου καί δὴ εἰς μίαν  
 περιοχὴν μέ πλῆθος βιοτόπων εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τήν δημιουργίαν  
 ποικίλων μορφῶν. Ἀλλ' ὡς ἤδη ἀνεφέρθη, ἀπεφύγαμεν τήν δημιουρ-  
 γίαν περισσοτέρων ταξινομικῶν μονάδων καί δὴ εἰς τήν βαθμίδα τῆς  
 ποικιλίας. Περιωρίσθημεν μόνον εἰς τήν διάκρισιν ὡς ἰδιαιτέρας  
 ταξινομικῆς μονάδος καί δὴ ὡς ὑποείδους (subsp. *insularis*), ὡρι-

σμένων πληθυσμών των Κυκλάδων και της Σκύρου.

Ἡ γεωγραφική ἐξάπλωσις τῆς *C. hellenica* ἐκτείνεται, ὡς ἤδη ἀνεφέρθη, εἰς τό μεγαλύτερον μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου. Ἀσαφῆ παραμένουν τὰ ὅριά της εἰς τὴν Θράκην. Εἶναι ἀληθές ὅτι ἐκ τῆς περιοχῆς αὐτῆς δέν ὑπάρχουν ἀρκεταί μαρτυρίαι. Εἰς τό σημεῖον τοῦτο πρέπει νά ἀναφερθῆ, ὅτι ἡ *C. hyoseroides* Sm. in Sibth. et Sm., Fl. Graec. Prodr. 2: 139 (1813), συλλεγεῖσα ὑπό τοῦ SIBTHORP "in campis Thraciae", πλησιάζει πιθανῶς πρὸς τὴν *C. hellenica* (s.l.). Ἡ ὑπαρξις ὅμως ἀνεπαρκῶν στοιχείων δέν ἐπιτρέπει τὴν ἀκριβῆ ταξινομικὴν τοποθέτησιν τῆς *C. hyoseroides*. Πάντως δέν πρέπει τό εἶδος τοῦτο νά ταυτισθῆ πρὸς τὴν *C. neglecta*, ἐξ ἧς διαφέρει, κατὰ τὴν περιγραφὴν του, ἐκ τῶν ἀδενωδῶν τριχῶν τοῦ περιβλήματος "involucrum subcylindraceum, glanduloso-pilosum", ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆ βάσει τῆς εἰκόνης του (Sibth. et Sm., Fl. Graeca, tab. 809), καθ' ἣν εἶναι σαφῆς ἡ διαφορετικὴ ὄψις τοῦ φυτοῦ. Περαιτέρω ἔρευνα εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Θράκης εἶναι ἀναγκαῖα διὰ τὸν ἀκριβῆ καθορισμὸν τοῦ ὀρίου τῆς *C. hellenica* εἰς τὴν ἐν λόγῳ περιοχὴν. Πάντως πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι, ὀλίγον ἀνατολικώτερον καὶ δὴ ἐκ τῆς νησίδος Ἀντιγόνης, παρὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν, εἶδομεν φυτὰ (Aznavour, α. 1893) τὰ ὅποια, ἂν καὶ οὐχὶ τυπικά, δύνανται νά χαρακτηρισθοῦν ὡς *C. hellenica* (s.l.). Καὶ ἐκ τῆς περιοχῆς αὐτῆς προφανῶς εἶναι ἀναγκαῖα ἡ περαιτέρω ἔρευνα.

Εἶναι πάντως χαρακτηριστικὸς ὁ εἰς Β. Ἑλλάδα ἐντοπισμὸς τῆς *C. hellenica* ἐπὶ τῶν παραλίων περιοχῶν, ὥστε ἡ γεωγραφικὴ ἐξάπλωσις της σχεδὸν νά συμπύπτη κατὰ τρόπον ἐκπληκτικὸν μετὰ αὐτὴν τῆς ὁμάδος τῆς *Campanula rupestris* (PHITOS 1965) (Εἰκ. 31).





Είη. 3Α. Κεφάλια έν καρποφορία καί άχαύνια (περιφερειακά καί έπίδύσκια) τών: α, *C. neglecta* subsp. *neglecta*. β, *C. neglecta* subsp. *corymbosa*. γ, *C. hellenica* καί δ, *C. cretica* (Σχέδια Η. Lünser).

Fig. 4

