

trum breve sensim attenuata. Pappus pluriserialis pilosus albissimus. — Herba reg. Mediterraneæ incola perennis glabra. Radix tuberosa ovata. Caules basi flagelliformes sub terrâ fibroso-radicantes. Folia è collo orta ovali-oblonga utrinque acuminata integra aut subdentata. Scapi erecti apice summo cum involucri basi piloso-glandulosi aphylli simplices, rarissimè bifidi subfoliosi. Flores flavi.

1. *E. ZELOSIA* (Cass. l. c.).  $\mathcal{H}$  in arenis maritimis et etiam rariùs in rupium fissuris Galliarum australioris, Corsicæ, Italiæ, Siciliæ, Dalmatiæ, Istriæ, Archipelagi. Etiam ex Armoricâ misit cl. Bonnemaison. *Leontodon bulbosum* Linn. sp. 1132. *Hieracium bulbosum* Willd. sp. 3. p. 1562. *Crepis bulbosa* Frösl. in lit. *Prenanthes bulbosa* DC. fl. fr. n. 2883. *Taraxacum bulbosum* Reichenb. fl. exc. n. 1792. *Hieracium stoloniferum* Viv. fragm. 1. t. 20. — *Clus. hist. 2. p. 145. f. 2. Lob. icon. t. 230. f. 2. (v. v. et s.)*

DCCCXXVII. *CREPIS* *Macrob. mech. 534. DC. fl. fr. ed. 3. v. 4. p. 38. Less. syn. 136. Frösl. in lit. 1837 (1).* — *Crepis Phœcasium* et *Brachyderea* Cass. — *Crepidis* et *Hieraci* sp. *Linn. et succ.*

Capit. multiflorum. Invol. duplex, int. 1-seriale, ext. breve calyculiforme. Recept. epalesceum. Achania teretiuscula exalata sensim in rostrum breve attenuata. Pappus pilosus albus mollis multiserialis. — Herbæ pleræque Europæe annuæ aut biennes erectæ ramosæ. Folia sæpiùs pinnatifida, formâ in iisdem speciebus varia. Flores flavi. Invol. ferè Senecionis. — Genus naturalissimum cum ad hoc revocantur species omnes *Hieraci* auctorum pappo niveo donatæ. Cæterùm specierum limites et diagnoses difficillimæ et genus monographis commendatum.

Sect. I. *PHÆCASIUM* *Reichenb. fl. exc. 1. p. 257. — Phœcasium Cass. dict. 39. p. 387.*

Capit. pauciflorum. Invol. squamæ exteriores adpressæ.

1. *C. PULCHRA* (Linn. sp. 1134), caule erecto basi simplici apice laxè paniculato, foliis radicalibus runcinatis basi attenuatis, caulinis ovato-lanceolatis basi sagittatis dentatis integrisve, invol. cylindraceo, squamis exter. paucis acutis brevibus margine scariosis. ( $\mathcal{H}$ ) in rudertis et collibus Galliarum ferè totius, Germaniæ, Italiæ, Tauriæ, Asiæ occid., etc. *Chondrilla pulchra* Lam. dict. 2. p. 77. *Prenanthes paniculata* Moench met. 534. *Lampsana pulchra* Vill. dauph. 3. p. 163. *Prenanthes hieracifolia* Willd. sp. 3. p. 1541. *Prenanthes pulchra* DC. fl. fr. ed. 3. n. 2882. *Phœcasium lampsanoides* Cass. dict. 39. p. 387. *Hieracium pulchrum* J. Benth. hist. 2. p. 1025. *Prenanthes viscosa* Baumg. — *Moria, ox. 2. 7. t. 5. f. 13 et 37. Variat caule glabro aut pube parvâ scabro, foliis radical. runcinatis aut vix dentatis. (v. v. et s.)*

*β. lampsanifolia*, paniculâ confertiore, pedunculis brevioribus magis erectis. ( $\mathcal{H}$ ) *Hierac. leptomacrosaulos* Col. oeph. t. 269. *Crepis pulchra β* Linn. l. c. *Crepis lampsanifolia* Reichenb. fl. exc. 1. p. 257. (v. s.)

Sect. II. *BRACHYDEREA*. — *Brachyderea* Cass. dict. 48. p. 429.

Capit. multiflorum. Invol. squamæ externæ adpressæ. Recept. subimbriliferum.

2. *C. RIGIDA* (Willst. et Kit. pl. var. hung. 1. p. 18. t. 19), subcaudex, caule erecto rigido striato, foliis dentatis rigidis, radicalibus obovatis, caulinis sagit-

(1) Sectiones generis IV, V et VI, à cl. Frösl. elaboratæ sunt et usâ cum *Hieraciorum* synonymi communicatæ.

\*\* *Scapo polycephalo.*

42. *C. SILENIFOLIA* (Froel. mss.), scapo subaphyllo polycephalo subpaniculato foliisque oblongo-obovatis subintegerrimis hirsutis, involucri ovatis laxiusculis glanduloso-hirtis.  $\bar{\zeta}$ ... Scapus vix apothamalis rigidulus supra medium in pedunculos 3-4 alternos subfastigiatos divisus subaphyllus. Folia coriacea subtus glauca elliptico-obovata petiolata. Involucrium pilis albis longiusculis articulatis basi incrassatis apice glanduliferis intermixto tomento albo vestitum. (v. s. in herb. Vahl.)

\*\*\* *Caulis folioso.*

43. *C. SALICIFOLIA* (Froel. mss.), caule stricto folioso corymboso oligocephalo, foliisque lanceolatis denticulatis subtus glaucis glabris, caulibus sessilibus, pedunculis unifloris apice squamosis, involucrio cylindraceo scabro basi laxiusculo.  $\bar{\zeta}$  ad rivum Lenam Sibiria. Hier. caule superius ramoso, foliis paucis lanceolatis Gmel. sib. 2. p. 30. t. 13. f. 1. bon. Folia coriacea avenia lanceolata obtusiuscula glanduloso-denticulata glauca subtus uti caulibus floccosa. Involucri squama obtusa dorso ad lentem setulis minimis scabra, extima laxiuscule glabra. (v. s. sp. in herb. Schreb. comm. à cl. Pallas.)

44. *C. HETEROZYXA* (Froel. mss.), caule erecto ramoso paucifolio paniculato, foliis glaucis subintegerrimis margine ciliatis scabris, radic. spatulato-lanceolatis petiolatis, caulibus sessilibus linearibus, pedunculis apice involucrioque farinosis, stigmatibus subtribus.  $\bar{\zeta}$  ad rupes propè Ragusam Dalmatiae, ad Jaderam. Hierac. stoppeum Reichenb. fl. exc. p. 265. Hierac. glaucum Asch. fl. jard. p. 202? H. Tomasiini Host fl. austr. 2. p. 272? teste cl. Weiboo. Habitus Hier. glauci veri sed pappus egregie albus pluriserialis. Stigmata sessilimè 3! singulare in genere exemplum. Color herbarum glaucus. Folia membranacea nervo praesertim margine pilis albis mollibus longissimis tuberculo conico nigro persistenti insidentibus, inde ad lentem quasi nigro-serrulata. (v. s. sp. comm. à cl. Weiden.)

45. *C. PULMONARIÆFOLIA* (Froel. in litt. 1837), caule erecto subaphyllo oligocephalo, foliis membranaceis reticulatis glaucescentibus ciliatis, radic. cordato-ovatis denticulatis, petiolis villosis, caulibus paucis bracteiformibus, capitulo cylindraceo glabro gracili.  $\bar{\zeta}$  in montibus Apenninis. Caulis vix spithamealis simplex sursum in pedunculos 3-4 divisus glaber. Folia exactè Pulmonariæ officinalis tenuis subdiaphana subtus reticulata. Capitulum gracile Prenanthidis, Pappus fructu colmanari dimidiò longior. (v. s. sp. comm. à cl. Jan.)

46. *C. PYRÆMA* (Linn. spec. 1131), caule basi subramoso decumbente folioso, pedunculis elongatis submonocephalis apice involucriisque camo-floccosis, foliis petiolatis lyratis, lobo terminali maximo subcordato dentato, petiolaribus alternis minutis.  $\bar{\zeta}$  in glareosis summorum Alpium Helvetiae, Sabaudiae! Galliae, Pyrenaeorum. H. prunellæfolium Gouan obs. 57. t. 22. f. 3. opt. Al. ped. t. 15. f. 2. bon. DC. fl. fr. 4. p. 54. Willd. herb. 14675! Omalocline Cass. Monn. em. p. 76. Hieracium pygmaeum Lam. H. pusillum Linn. Leon-todon dentatum Linn. Lepicoune prunellæfolia Lapeyr. Achrasium apice attenuatum. Pappus albus pluriserialis.

β. *integrifolia* (Froel. mss.), foliis integris ovato-lanceolatis dentatis longe petiolatis. Boer. mus. 2. p. 33. t. 24. (v. s. sp. ex Alp. Helv.)

γ. *incanescens* (Froel. mss.), herba tota praesertim foliis albo-tomentosa in monte Ventoso. (v. s. sp.)

δ. *glandulosa* (Froel. mss.), petiolis involucriisque glanduloso-hirsutis. (v. s. sp.)

ε. *colorata* (Froel. mss.), venis foliorum rufis. (Helv. v. s. sp.)

47. *C. LAMPANOIDES* (Froel. in litt. 1837), caule stricto folioso paniculato-corymboso foliisque hirtis, inferioribus lyratis dentatis basi articulato-plexicaulis, superioribus integris cordatis amplexicaulis, involucriis imbricatis acutis pedunculisque glanduloso-hispidis.  $\bar{\zeta}$  in Pyrenaeorum orient. sylvis