

superioribus subfagittato - lanceolatis integerrimis, floribus paniculatis, anthodio hispidulo. *Patria?*

- Magadioloides* 14. Cr. scabra ramosa, foliis amplexicaulibus subfagittato - lanceolatis deorsum dentatis, ramis simplicibus alternis, anthodio toruloso dorso muricato, pilis clavatis. *Hispan. baetica.*
- Spera* 15. Cr. hispida ramosa, foliis amplexicaulibus oblongis dentatis, ramis patentibus sub-1floris, anthodio toruloso muricato, involucreo deciduo. *Sicil. Creta. Asia minor.*
- Sprengeriana* All. 16. Cr. hispidula, foliis amplexicaulibus oblongis remote dentatis, ramis divaricatis, involucreo anthodii patulo inaequali persistente. *Italia. Lusitania. Afric. bor.* (Hieracium Sprengerianum L. Cr. nigricans Viv.)
- Hieracioides* Kit. 17. Cr. glabriuscula pauciflora, foliis inferioribus spathulato - oblongis sinuato - dentatis, caulinis lanceolatis, anthodiis glanduloso - pilosis. *Hungaria.*
- Britica* 18. Cr. caule erecto hispido, foliis dentatis rugosis, inferioribus spathulato - oblongis, superioribus amplexicaulibus cordato - ovatis, anthodio laxo hispidiusculo. *Polhynia. Caucas. Sibiria* (Hieracium sibiricum W.)
- Alida* Kit. 19. Cr. caule stricto elato, foliis sinuato - dentatis asperis, radicalibus spathulato - oblongis, caulinis amplexicaulibus sagittatis, ramis floriferis rigidis, anthodiis albo - tomentosis. *Hungaria. Transylvania. Podolia. Tauria, Caucas.*
- Hyoseroides* Sm. 20. Cr. foliis inferioribus obovatis integerrimis, superioribus sagittatis subdentatis, ramis 1floris, anthodiis pilosis. *Thracia.*
- Pulera* 21. Cr. caule erecto ramosissimo glabro, foliis radicalibus spathulatis dentatis pubescentibus, caulinis sagittatis amplexicaulibus, anthodio cylindrico glaberrimo subviscido. *Gallia. Anglia. Italia. Graecia. Tauria.* (Prenanthes hieracifolia W.)
- grandiflora* W. 22. Cr. caule superne diviso dupliciter piloso, foliis lanceolatis, inferioribus amplis sinuato - grandidentatis hirsutiusculis, superioribus sagittatis integerrimis, anthodiis hirsutissimis. *Sibiria?*
- nana* Richardf. 23. Cr. glaberrima pumila glauca, foliis inferioribus petiolatis ovatis integerrimis 3nerviis subtus rubentibus, floribus corymbosis, anthodio laevi. *Ad fl. cupri Amer. arctic.*

†† *Foliis lyratis, runcinatis.*

- Heterosperma* Schrad. 24. Cr. caule ramoso superne pubescente, foliis inferioribus lyratis dentatis, caulinis amplexicaulibus sagittatis sinuato - dentatis, pedunculis 2fidis, anthodio subglobofo toruloso incano glanduloso - piloso, seminibus radii angulatis, disci fu-

- siformibus. *Germania. Gallia.* (Cr. Diofcoridis Schk. Cand.; globifera Hall. fil. Cr. virens L.?)
- Diofcoridis* 25. Cr. caule laevi, ramis divaricatis, foliis radicalibus runcinatis, caulinis hastatis lineari-lanceolatis profunde dentatis, pedunculis elongatis 1floris, anthodio incauo-subtomentoso, seminibus conformibus. *Gallia.*
- Iodomiriensis* 26. Cr. caule ramoso glabriusculo, foliis hispidiusculis, radicalibus runcinatis, caulinis profunde dentatis, anthodio submuriculato. *Germania, Galicia.*
- neglecta* 27. Cr. caule ramoso glabro, foliis radicalibus sublyratis dentatis pubescentibus, caulinis sagittatis basi incis, floribus paniculatis ante anthesin nantibus, anthodio glabro albo-farinoso. *Italia, German. austr. Thracia.* (Cr. stricta Scop. Sebast., virens Sav.)
- scabra* W. 28. Cr. caule ramoso glabriusculo, foliis runcinatis hispidis, radicalibus obovatis, caulinis basi auriculatis sessilibus, corymbo composito terminali, anthodio tomentoso, involucreo appresso. *Gallia. Italia.*
- multiflora* Sm. 29. Cr. caule ramossimo, foliis runcinatis amplexicaulibus glabris, superioribus sagittatis subdentatis, anthodio setoso. *Thracia?* (Cr. parviflora Desf.?)
- incana* Sm. 30. Cr. caule ramoso, foliis runcinato-pinnatifidis lanatis sessilibus, summis lanceolatis, anthodio densissime lanato. *Euboea.*
- fuliginosa* Sm. 31. Cr. caule ramoso hispido, foliis inferioribus lyratis fetaceo-dentatis pilosis, summis sagittatis subintegerrimis, anthodio nigrescente villosissimo. *Ins. ion. et maris aegaei.*
- agrestis* Kit. 32. Cr. caule angulato foliisque subhispidulis, inferioribus runcinatis, superioribus lanceolatis pinnatifidis, panícula subcorymbosa, anthodio subtomentoso fetuligero. *German. med. Hungar. Transylvan. Podolia. Caucas.*
- corymbosa* 33. Cr. caule tereti hirsuto, foliis subcarnosis, radicalibus spathulato-runcinatis, caulinis sagittato-lanceolatis basi multifidis, floribus corymboso-paniculatis, anthodiis hispidis. *Neapol. Sicil. Ins. maris aegaei?* (Cr. montana Urv.? Barkhausia hyemalis Gussone. non Bivon.)
- cernua* Tenor. 34. Cr. caule basi ramoso foliisque glabris, radicalibus spathulato-runcinatis, caulinis hastato-lanceolatis, pedunculis cernuis, anthodiis glaberrimis. *Neapol.*
- lectorum* 35. Cr. caule subramoso angulato glabriusculo canescente, foliis inferioribus lanceolatis sinuato-dentatis runcinatis superioribus sagittato-linearibus, anthodio incauo-pubescente, seminibus scabris sulcatis. *Europ.* (Cr. Lachenalii Gand. var. foliis indivisis, caule simplici in solo macroarenoso.)