

- β. runcinata* (Frøel.) mss. scapo 1-cephalo, foliis runcinato-pinnatifidis. (v. v. s. in Alp. Algov.)
- γ. taraxaciformis* (Frøel. mss.), scapo monocephalo humili crassiusculo, capitulo tumido glabriusculo, foliis spathulatis dentatis sessilibus. (v. v. in Taureno Rauviciensi in confinibus Salisburgiæ et Carinthiæ suprà glacies æternas). An propria species? Flos magnitudine et formâ Taraxaci Dentis-leonis, etc., sed croceus, scapus vix bipollicaris crassiusculus ascendens, folia obovato-oblonga vix petiolata, capitulum ovatum crassiusculum.
- δ. leiocephala* (Frøel. mss.), scapo sub-2-cephalo, involucro glabro. (v. v. in Alp. Algov.)
- ε. Halleriana* (Frøel. mss.), scapo diviso dicephalo. Taraxacum calycibus hirsutis squamis rectis Hall. hist. n. 57. t. 1. bon. (v. v. cum priore.)
- ζ. crocea* (Frøel. mss.), foliis runcinatis utrinque glabris, caule paucifolio ramoso, ramis longis nudis unifloris calycibus villoso-nigrescentibus.— Scapus 3-4-cephalus subfoliatus: pedunculis elongatis laxiusculis. Flos crocens. Involuci figura et indumentum idem ac in typo. Vix propria species et syn. Gmel. potius H. alpestri Jacq. adscribendum, cum auctor ipse flores flavos prædicat. (v. v. in Taureno Rauvie.) (1).
37. C. KITAIBELII (Frøel. mss.), scapo 1-cephalo aphyollo foliisque glabris, primordialis integris linearibus, secundariis lanceolatis acutis subruncinato-dentatis, involucro glabriusculo (flor. flavis). \mathcal{U} in Alpibus Croatiae. Hieracium Alpinum Willd. herb. 14635! n. A! Nimis affinis H. Alpino à quo differt, monente cl. Kitaibelio in litt., flore dimidiò minore constanter flavo, involucro ferè glabro basi tantum pilis rarissimis articolatis adsperso, squamis multò angustioribus linearibus, foliis multò minoribus longè petiolatis. (v. s. sp. comm. à cl. Kit.)
38. C. HETEROTRICA (DC. herb.), acaulis, foliis radicalibus linearis oblongis acuminatis in petiolum attenuatis semipinnatifidis, lobis remotis acuminatis pilis rigidis eglandulosis hirtellis, scapo foliis triplo longiore 1-cephalo scabro, pilis ad apicem et ad involucrum rigidis glanduliferis, invol. imbricato corollis longiore. \mathcal{U} in Oriente ad Alpes Zerokou dictas legit cl. Aucher-Eloy! Hieracium glandulosum Anch.! pl. exs. n. 3549 non Schnlt. Achænia glabra lœvia. Pappus albus multiserialis. Ligulæ flavæ invol. breviores. (DC. v. s. comm. à cl. inv.)
39. C. ARMENA (DC. herb.), acaulis breviter glanduloso-pubescentes; foliis radicalibus obovatis oblongis in petiolum attenuatis acutè inciso-dentatis, scapo nude aut petiolum lineare integerrimum gerente 1-cephalo, invol. squamis lanceolato-linearibus acuminatis circ. biseriatis. \mathcal{U} in Armeniâ legit cl. Aucher pl. exs. n. 3280! Herba 3-pollicaris Leontodontis facie. (DC. v. s. comm. à cl. inv.)
40. C.? SIMPLEX (Frøel. in litt. 1837), scapo 1-cephalo aphyollo supernè incrassato squamoso, involucro simplici cylindraceo, foliis spathulatis sinuato-dentatis, \mathcal{U} ? in pratis propè Cyrenam Africæ hor. Hieracium simplex Viv. fl. libyc. et in bot. zeit. 1825. p. 636. non Lapeyr. Plantam à me non visam huc refero cum auctor fructus subrostratos indicat. An potius Barkhausia species? †.
41. C. SCHREBERI (Frøel. in litt. 1837), seapo submonocephalo subunifolio, foliis lanceolatis runcinato-pinnatifidis glabris, lacinias linearibus subdentatis mucronatis, involucro simpliciuseculo cano-tomentoso hirsuto. \mathcal{U} ?.... Hierac. Gmelini Schreb. herb. Habitu affinis H. alpestri Jacq. à quo differt radicis capite albo-villoso, involucro imbricato nec squamis majoribus obvallato, foliorum lacinias dentibusque mucrone albo acuminato terminatis. (v. s. in herb. Schreb.)

(1) Sub nomine Hier. crocei recepi à cl. Turezaninow stirpem in lápidosis Transbaicalensis et arenosis Mongolicis crescentem, variantem caule simplici aut ramoso 1- aut polyccephalo, pilis invol. albidis aut nigris. Mihi videtur species propria nempè Hier. croceum Lam. dict. 2. p. 360. Willd. sp. 3. p. 1571. Gmel. fl. sib. 2. p. 22. t. 8. f. 1. (DC. v. s.)