

9.— *Zapateria hirsuta* (BTH.).

Var. *albiflora* PAU.

(*Ballota mollissima* BTH?)

Corola de un color blanco de leche. Anteras doradas.

Hab. en *La Gola* (Segorbe) un solo pie. Julio 1886.

10.— *Crepis hispanica* PAU.

Radice annua.

Caule unico, erecto, flexuoso, fistuloso, inferne hispido, superne glabro paniculato-ramoso.

Foliis inferioribus cinereo-virentibus, pubescentibus, lineari lanceolatis, runcinatis, dentatis vel integris, in petiolo decurrentibus; ceteris linearibus, longue acutatis, margine dense et eleganter ciliatis, sessilibus, non amplexicaulibus; summis filiformis.

Calathiis longiuscule pedunculatis, cymoso-corymbosis, 30 floribus, aut plus; squamis externis minutis, triangularibus, internis lineari-acutatis, omnibus glabris. Floribus flavis.

Achæniis erostratis, cylindricis; striatis, superne contractis, et periphericis pauce scabridis. Pappo anthodium equante.

Caule 56^{cm}; anthodii diametro 3-4^{mm}.

Hab. in collibus reg. inferioris loco dicto «barranco de la Torrecilla», Altura (Valencia). Jul. 1886.—Juxta *Cr. pulchram*. L.

11.— *Rubus (valentinus)* PAU.

Fruticosa y con los turiones arqueado-decumbentes.

Ramos estériles con cinco ángulos, poco acanalados, amaritados superiormente, verdes en su parte inferior, glaucos. Ramos fértiles cilindráceos inferiormente, en su parte florífera débilmente angulosos, pulverulentos y con pelos claros. Dilatado-comprimidos, rectos, ó poco inclinados los agujones; falciformes los superiores: pulverulentos.

Hojas de los ramos estériles con cinco hojuelas, las de los florales de tres: trasovado-elípticas, acuminadas ó no, pecioluladas; la terminal mayor y circular y peciolillo más largo: dentadas, dientes redondeados, denticulados y mucronaditos. Peciollillos de las hojuelas laterales alguna vez zarcillosos. Peciolos planos superiormente, con agujones en hoz