

An kräuterreichen Stellen bei Han Toplica (Blau), häufiger auf den Hochgebirgen,  
so auf der Bjelašnica, Treskavica; Juni.

*Mulgedium Pančićii* Visiani, Plant. Serb. pempt. in Memor. dell' istit. Venet., IX  
(1860), pag. 173, Taf. XI—XII.

In Voralpenwäldern auf der Treskavica (Blau); in Waldschluchten ober Udbar  
auf der Prenj Planina; Juli.

*Trichocrepis bifida* Visiani, Stirp. dalm. spec., pag. 19 (1826) et in Flora (1827),  
pag. 73.

An steinigen, wüsten Plätzen um Sarajevo, namentlich auf den Abhängen des  
Castellberges (Hofmann, Beck).

*Crepis setosa* Hall. fil. in Römer, Archiv, I, 2, pag. 1 (1797).

Auf Brachen, schotterigen Stellen hie und da um Sarajevo; um Konjica im Fluss-  
geschiebe; Juni, Juli.

*Crepis incarnata* Tausch in Flora (1828), Erg.-Bl. I, pag. 79.

Var. *Crepis dinarica* (Taf. III, Fig. 2).

Folia omnia dense rosulata, breviter lingulata, obovata vel oblonga obtusa, glabre-  
scentia, basim versus vix (in petiolum brevem nunquam) attenuata, integra  
rarissime paulo denticulata. Scapus pauci (1—4) florus. Capitula iis formae  
typicae duplo majora, multiflora; anthodium e basi hemisphaerica late cylind-  
raceum, cum squamis numerosis, intimis 10—12 Mm. longis, iis formae  
typicae duplo latioribus. Inflorescentia semper simplex.

In pratis alpinis et subalpinis montium Romanja Planina, Treskavica et Prenj  
Bjelašnica Hercegovinae; Junii, Julii (Exsicc. Nr. 61).

Forsan eadem cum *Crepis incarnata* Tausch var. *pauciflora* Pantocsek, Ad-  
not., pag. 49 non Desf., Cat. h. paris., ed. 2, pag. 103 ex DC., Prodr., VII,  
pag. 161, sed ex descriptione »corymbo simplici, 2—3 cephalo, humilior« non  
recognoscenda.

Hiezu gehört wahrscheinlich auch die *Crepis incarnata* Tausch, welche Blau  
auf dem Trebović auffand.

*Crepis aurea* Cass., Dict. sc. nat., XXVII, 4 sec. Lessing; Tausch in Flora (1828),  
Erg.-Bl. I, pag. 78.

In Wiesen am Südabhang der Bjelašnica gegen Lukavac, Juni.

*Crepis biennis* L., Spec. plant., pag. 807 (1753).

In Wiesen, Obstgärten, Brachen, unter Getreide verbreitet.

*Crepis viscidula* Fröhl. in DC., Prodr., VII, pag. 166 (1838).

In Alpentriften auf der Treskavica; auf der Prenj Planina; Juli.

*Crepis montana* Tausch in Flora (1828), Erg.-Bl. I, pag. 79.

In Wiesen der höheren Voralpen und in Alpentriften auf der Bjelašnica, Treska-  
vica, Vratlo, auf der Suha gora, Maglić.

*Hieracium Hoppeanum* Schultes, Flor. Austr., ed. 2, II, pag. 428 (1814).

Subsp. *Hieracium leucocephalum* Vukot., Hierac. Croat., pag. 6 (1658); Naeg. et  
Peter, Hierac. Mittel-Europ., pag. 123.

Auf dem Trebović bei Sarajevo; Mai.

*Hieracium pilosella* L., Spec. plant., pag. 800 (1753).

Subsp. *Hieracium submelanops* Naeg. et Peter, l. c., pag. 146.

Auf der Bjelašnica; Juni.

Subsp. *Hieracium micradenium* Naeg. et Peter, l. c., pag. 164.

## Erklärung der Tafeln.

---

### Tafel II (1).

- Fig. 1 *Orchis bosniaca* in natürlicher Grösse;  
 » 2 eine Blüthe derselben von der Seite;  
 » 3 von vorne gesehen (vergrössert);  
 » 4 eine Blüthe von *Aceras calcarata* (natürliche Grösse);  
 » 5 ein blühendes und ein fruchtendes Exemplar von *Alyssum Moellendorfianum* Aschers. (natürliche Grösse);  
 » 6 unten eine Frucht und Blüthe, oben die längeren Staubblätter, Pistill und ein kürzeres Staubblatt desselben;  
 » 7 ein Sternhaar des Blattes (alle vergrössert).

### Tafel III (2).

- Fig. 1 ein blühendes Exemplar von *Plantago reniformis* (verkleinert);  
 » 2 eine Blüthe derselben (vergrössert);  
 » 3 ein blühendes Exemplar von *Veronica integerrima* (natürliche Grösse);  
 » 4 Früchte von *Caltha longirostris* (natürliche Grösse);  
 » 5 *Polygala prenja*, blühende Pflanze in natürlicher Grösse;  
 » 6 Frucht derselben;  
 » 7 Griffel, oberhalb desselben eine Blüthe von der Seite gesehen (alle vergrössert).

### Tafel IV (3).

- Fig. 1 eine blühende Pflanze von *Pedicularis scardica* und  
 » 2 von *Crepis dinarica* (beide in natürlicher Grösse).

### Tafel V (4).

- Fig. 1—4 *Viola prenja*;  
 » 1 eine blühende Pflanze in natürlicher Grösse;  
 » 2—3 Blüthen von der Seite und von vorne gesehen;  
 » 4 Kelch von rückwärts gesehen (vergrössert);  
 » 5—7 *Stachys Sendtneri*;  
 » 5 ein Fruchtexemplar in natürlicher Grösse;  
 » 6 ein Fruchtkelch;  
 » 7 eine Blüthe von dem Sendtner'schen Exemplar aus Bosnien (beide vergrössert);  
 » 8—9 *Saxifraga prenja*;  
 » 8 blühende Pflanze in natürlicher Grösse;  
 » 9 eine Blüthe (vergrössert);  
 » 10 *Gentiana dinarica*, eine blühende Pflanze in natürlicher Grösse.



Beck del.

Lith. Anst. v. Th. Bannwarth, Wien.

1 *Pedicularis scardica*, 2 *Crepis dinarica*.

Annal. d. k. k. Naturhist. Hofmuseums Band II. 1887.