

Veget. Herbae perennes aut annuae 1-∞ florae, foliis saepe runcinato-dentatis partitisve.

Divisio. E vegetatione subdividi possunt in scapigeras, et cauliferas, foliis sessilibus, aut amplexicaulibus.

Werden nun zu Folge dieses Charakters einige Arten von *Crepis* L. ausgeschlossen z. B. *C. Diogoridis* und *aspera*, von welchen später die Rede seyn soll; so lassen sich mehrere *Hieracien* von Linné und Willdenow vollkommen mit *Crepis* vereinigen. Ueberhaupt bedarf aber die itzt bestehende Gattung *Crepis* noch immer einer genauern Durchsicht, so z. B. ist *Crepis nudicaulis* Sieber Spreng. nichts anderes, als *Lagosotis nemausensis* M. B. (*Hieracium sanctum* L. *) *Crepis radicata* Forsk. Spreng **) und *rhagadioloides* L. gehören zur Gattung *Picris*.

Von *Hieracien* gehören folgende hieher:

C. bulbosa (H. bulbosum Willd.) Varietatem scapo 5-floro, foliis nuncinatis e Creta possideo.

C. aurea (H. aureum Willd.) Variat scapo 2-5-floro, foliis integris et runcinatis.

C. Gmelini (H. Gmelini L.) Scapus non semper multiflorus, sed etiam 5-florus.

β. *H. croceum* Lam. (Gmel. sib. 2. t. 8. f. 1.) est varietas grandiflora, foliis magis dissectis *C. Gmel.*

*) *Crepis nemausensis* Sieber. Fl. cret. exs. est *C. tenerrima* Tausch rar. Cretae MS.

**) Cum hac promiscue Sieber in Flora aegypt. exs. novum genus, *Ptilosiam spargioides* Tausch exot. MS. exhibuit.

lini. Gmelin in utraque flores luteos nec croceos descripsit.

C. praemorsa (H. praemorsum L.)

C. incarnata (H. incarnatum Wulfen) β . *glabra*: foliis glabris γ . *lutea*: floribus luteis (in al-
pibus ad Bassano Com. a. Sternb.)

C. alpestris: (H. alpestre Jacq. Willd.) Variat
scapo 2-3 floro, foliis integris et runcinatis.

C. montana (H. montanum Jacq. Willd.)

C. hyoseridifolia (H. hyoseridifolium Pers.)

C. Jacquini (H. chondrilloides Jacq. L.) Variat
caule 1-floro et foliis integris.

C. succisaefolia. (H. succisaefolium All.) Va-
riat foliis latioribus aut angustioribus, dentatis aut
subintegerrimis, denique tota glaberrima aut plus
minusve pilosa subhirta, et qua varietates hic spec-
tant: *H. integrifolium* Hoppe, *H. molle* Jacq. *H.*
croaticum W. et Kit. Willd. et denique *Crepis*
hieracioides W. et Kit. Willd. Spr. (e spec. aut.)

C. hieracioides (Gmel. syst. nat. 2. p. 1180. H.
lyratum L.) caule folioso apice corymboso, pedun-
culis anthodioque glanduloso-pilosis; foliis oblongo-
lanceolatis repando-dentatis, superioribus subhastato-
amplexicaulibus. Media quasi inter *C. succi-*
saefolium et *paludosum*, priori tamen magis affi-
nis, a qua praecipue foliis subhastatis differt.

C. paludosa (H. paludosum L.) α . *latifolia*
 β . *angustifolia* γ . *incisa*.

C. blattarioides. (Vill. delph. 3. p. 136. H. py-
renaicum Willd.) α . *latifolia* β . *angustifolia*
 δ . *glabra* δ . *uniflora*.