

*Veget.* Herbae perennes aut annuae 1-∞ florae, foliis saepe runcinato-dentatis partitisve.

*Divisio.* E vegetatione subdividi possunt in scapigeras, et cauliferas, foliis sessilibus, aut amplexicaulibus.

Werden nun zu Folge dieses Charakters einige Arten von *Crepis* L. ausgeschlossen z. B. *C. Diogoridis* und *aspera*, von welchen später die Rede seyn soll; so lassen sich mehrere *Hieracien* von Linné und Willdenow vollkommen mit *Crepis* vereinigen. Ueberhaupt bedarf aber die itzt bestehende Gattung *Crepis* noch immer einer genauern Durchsicht, so z. B. ist *Crepis nudicaulis* Sieber Spreng. nichts anderes, als *Lagosotis nemausensis* M. B. (*Hieracium sanctum* L. \*) *Crepis radicata* Forsk. Spreng \*\*) und *rhagadioloides* L. gehören zur Gattung *Picris*.

Von *Hieracien* gehören folgende hieher:

*C. bulbosa* (H. bulbosum Willd.) Varietatem scapo 5-floro, foliis nuncinatis e Creta possideo.

*C. aurea* (H. aureum Willd.) Variat scapo 2-5-floro, foliis integris et runcinatis.

*C. Gmelini* (H. Gmelini L.) Scapus non semper multiflorus, sed etiam 5-florus.

β. *H. croceum* Lam. (Gmel. sib. 2. t. 8. f. 1.) est varietas grandiflora, foliis magis dissectis *C. Gmel.*

\*) *Crepis nemausensis* Sieber. Fl. cret. exs. est *C. tenerrima* Tausch rar. Cretae MS.

\*\*) Cum hac promiscue Sieber in Flora aegypt. exs. novum genus, *Ptilosiam spargioides* Tausch exot. MS. exhibuit.

*lini.* Gmelin in utraque flores luteos nec croceos descripsit.

*C. praemorsa* (H. praemorsum L.)

*C. incarnata* (H. incarnatum Wulfen)  $\beta$ . *glabra*: foliis glabris  $\gamma$ . *lutea*: floribus luteis (in al-  
pibus ad Bassano Com. a. Sternb.)

*C. alpestris*: (H. alpestre Jacq. Willd.) Variat  
scapo 2-3 floro, foliis integris et runcinatis.

*C. montana* (H. montanum Jacq. Willd.)

*C. hyoseridifolia* (H. hyoseridifolium Pers.)

*C. Jacquini* (H. chondrilloides Jacq. L.) Variat  
caule 1-floro et foliis integris.

*C. succisaefolia*. (H. succisaefolium All.) Va-  
riat foliis latioribus aut angustioribus, dentatis aut  
subintegerrimis, denique tota glaberrima aut plus  
minusve pilosa subhirta, et qua varietates hic spec-  
tant: *H. integrifolium* Hoppe, *H. molle* Jacq. *H.*  
*croaticum* W. et Kit. Willd. et denique *Crepis*  
*hieracioides* W. et Kit. Willd. Spr. (e spec. aut.)

*C. hieracioides* (Gmel. syst. nat. 2. p. 1180. H.  
lyratum L.) caule folioso apice corymboso, pedun-  
culis anthodioque glanduloso-pilosis; foliis oblongo-  
lanceolatis repando-dentatis, superioribus subhastato-  
amplexicaulibus. Media quasi inter *C. succi-*  
*saefolium* et *paludosum*, priori tamen magis affi-  
nis, a qua praecipue foliis subhastatis differt.

*C. paludosa* (H. paludosum L.)  $\alpha$ . *latifolia*  
 $\beta$ . *angustifolia*  $\gamma$ . *incisa*.

*C. blattarioides*. (Vill. delph. 3. p. 136. H. py-  
renaicum Willd.)  $\alpha$ . *latifolia*  $\beta$ . *angustifolia*  
 $\delta$ . *glabra*  $\delta$ . *uniflora*.