

желтые, в 1.5 раза длиннее обертки 13—15 мм дл. Семянки светло-коричневые, около 5 мм дл., хохолок белый, 5—6 мм дл. Табл. 46, 6.

На галечниках, песчаных наносах, в пойменных кустарниках, на щебнистых склонах. В. Сиб.: ЧИ — Ка (хр. Удокан, р. Читканда), ЯК — Ви (пос. Сангар), Ко, Ян, Ал. Карта 229. — Дальний Восток. Описан из Сибири.

9. *C. jacutica* Lomonosova sp. nov. — *C. nana* auct. non Richards. p.p. — С. якутская.

Plantae perennes glaberrimae 8—15 cm altae. Rhizoma tenue, longum. Caules numerosi ramosi foliosi, caespites pulviniformes efficientes. Folia lanceolata, elongato-elliptica vel elongato-obovata, ut tota planta, saepe violacea, pro norma integerrima, apice acuminata, longe tenuiter petiolata, lamina 13—35 mm longa, 7—20 mm lata, nervis lateralibus saepe manifestis. *Calathidia numerosa*. Involucra anguste cylindrica, 10—11 mm longa. Flores pallide flavi, involucri sublongiora. Achenia fusiformia 4.5—5 mm longa, longitudinaliter tenuiter costata, in rostrum distinctum tenue 0.5—1 mm longum abeuntia. Pappus albus, ca 7 mm longus.

Т у р у s: Jacutia, distr. Bulunensis, in denudationibus Sikiachensibus fl. Lena, fruticeta ad declive ripae e saxo primigenio formatae. 3.08.1970. A. Koroleva (NS).

А ф ф и н и т а s: Planta nostra speciebus Americae Borealis proxima. A *Crepide nana* subsp. *ramosa* Babc. acheniis distincte rostratis, a *C. elegante* Babc. vero rhizomate tenui superne haud lignescente necnon caulibus numerosis brevioribus differt.




Многолетнее, совершенно голое растение (4)8—15 см выс. Корневище тонкое, длинное. Стебли многочисленные, ветвистые, олиственные, образующие подушковидные куртинки. Листья ланцетные, удлинненно-эллиптические или удлинненно-обратнояйцевидные, как и все растение, часто фиолетовые, как правило, цельнокрайные, на верхушке заостренные, на длинных тонких черешках. Листовые пластинки 13—35 мм дл., 7—20 мм шир., часто с хорошо заметными боковыми жилками. Корзинки многочисленные. Обертки узкоцилиндрические, 10—11 мм дл. Цветки светло-желтые, немного длиннее обертки. Семянки веретеновидные, 4.5—5 мм дл., с тонкими продольными ребрами и с хорошо выраженным тонким носиком 0.5—1.0 мм дл. Хохолок белый, около 7 мм дл. Табл. 46, 10.

На щебнистых и каменистых склонах, галечниках. В. Сиб.: ЯК — Ол (пос. Сиктях — клас. мест. — и др.), Ко (пос. Зырянка), Ян, Ал, Ви (пос. Сангар). Карта 230. — Эндемик.

Наиболее близок к видам, известным из Сев. Америки. От *C. nana* subsp. *ramosa* Babc. отличается сеянками с хорошо выраженным носиком. От *C. elegans* Babc. отличается тонким не одревесневающим в верхней части корневищем, а также многочисленными и более короткими стеблями.

10. *C. karelinii* M. Pop. et Schischk. ex Czer. 1964 во Фл. СССР, 29 : 656. — *C. nana* var. *laxa* Kryl. — С. Карелина.

Многолетнее голое растение 3—8 см выс., с длинным тонким корневищем. Стебли одиночные или в числе нескольких, длиннее листьев, от основания ветвистые. Ветви тонкие, с 1 или несколькими корзинками. Листовые пластинки эллиптические, обратнояйцевидные или ланцетные, сизые, постепенно суженные в черешок, по краю б.м. крупнозубчатые, почти сидячие или на расширенных черешках, до 2(3) раз длиннее пластинок. Корзинки многочисленные, в щитковидно-метельчатом соцветии. Листочки обертки до 10—12 мм дл., темные, внутренне по краю пленчатые, в 5—8 раз длиннее наружных. Цветки желтые, в 1.5 раза длиннее обертки. Семянки светло-коричневые, 5—8 мм дл., веретеновидные, с едва заметным носиком и 10 хорошо выраженными ребрами. Табл. 47, 1.

228. *Crepis crocea* subsp. *dahurica*.229. *Crepis gmelinii*.230. *Crepis jacutica*.231. *Crepis karelinii*.