

breitert. Achene stielrund, od. kantig, od. etwas zsgedrückt, an der Spitze geschnäbelt, od. schnabellos u. an d. Spitze zsgezogen, od. daselbst von gleicher Breite.

89 PICRIDIMUM Desf. Picridie.

1. *P. vulgare* Desf. Untere B. buchtig-fiedersp., gezähnt, die oberen stengelumfassend, längl., fast ganzrandig; Bthstiele an der Spitze dicker; Blättchen des HK. angedrückt. ☉. Kultiv. O., Wege; Pola in Istrien u. bei Fiume. Apr. Mai. Scorzonera picroides L. Bl. gelb.

90. ZACYNTHA Tournef. Warzenkohl.

1. *Z. verrucosa* Gärt. ☉. Felder, unkultiv. O.; Littor. Mai. Jun. Lapsana Zazantha L. Bl. gelb.

91. PTEROTHÉCA Cassin. Pterotheke.

1. *P. nemausensis* Cassin. ☉. Unkultiv. O.; Fiume. Mai. Jun. Bl. gelb. Var.: randst. Achenen mit 3—5 häutigen Flügeln: *Lagoseris nemausensis* K. syn. ed. 1.; u. β .: randst. Achenen mit 4 stumpfern Kielen: *Lagoseris bifida* K. syn. ed. 1., *Trichocrepis bifida* Vis.

92. CREPIS L. Pippau.

1. Rotte. Achenen des Mittelfeldes od. alle lang-geschnäbelt. *Barkhausia* Moench., DC.

1. *C. foetida* L. St. aufrecht, beblättert, ästig, nebst den B. rauhh.; B. schrotsägef.-fiedersp., die obersten lanzettl., an d. Basis tief-ingeschnitten; Bthstiele v. dem Aufblühen nickend; Schnübel der randst. Achenen kürzer als der HK., die innersten länger als derselbe; HK. überall grau u. zottig, mit einfachen u. drüsentrag. Haaren; Blättchen des AussenK. lanzettl., spitz. ☉. Unkult. O.; zerstr. dch. das Geb. Jun.—Aug. *Barkhausia foetida* DC. pr., K. syn. ed. 1. Bl. gelb.

2. *C. rhoeadifolia* M. Bieberst. Suppl. St. aufrecht, beblättert, ästig, nebst den B. borstig-steifh.; B. schrotsägef.-fiedersp., die obersten lanzettl., an der Basis tief-ingeschnitten; Bthstiele vor dem Aufblühen nickend; Schnübel aller Achenen kürzer als der HK.; der ganze HK. v. starren Borsten steifh. u. etwas grau; Blättchen des AussenK. lanzettl., spitz. ☉. Sonnige O.; Brünn in Mähr. Jun. Jul. Bl. gelb. *Barkhausia rhoeadifolia* DC. pr., K. syn. ed. 1.

3. *C. rubra* L. St. aufrecht u. aufstrebend, einfach od. unterwärts ästig, nackt, an der Basis beblättert; B. schrotsägef.-fiedersp., die oberen lanzettl., an der Basis gezähnt; Bthstiele vor dem Aufblühen nickend; die randst. Achenen so lang als der fruchttrag. HK., die innersten länger als derselbe; die inneren

Gebirgige, steinige O.; südl. u. mittl. Geb. Mai. Jun. Hieracium praemorsum L. Bl. gelb.

8. *C. incarnata* Tausch. *St. blattlos, ebensträussig*; B. vktayf.-längl., an der Basis verschmälert, gezähnt. 4. VorA. u. Gbge, südl. Tyrol, Krain, Kärnth. ? Mai. Jun. Hieracium incarnatum Wulf. Bl. fleischroth, röthl. od. weiss, u. *β. lutea* Koch. syn.: Bl. gelb. *C. Froelichiana* DC. prodr. Hieracium parviflorum Schleich. Die rothe Farbe der Bl. geht dch das Weiss in das Gelbe über nach Facchini.

2. *St. blattlos* od. an der Basis mit einem od. dem anderen B., an der Spitze 1köpfig od. mit wenigen 1köpfigen Aesten.

9. *C. bulbosa* Tausch. *Schaft 1köpfig, blattlos* od. an der Basis 1blättrig, *an der Spitze nebst der Basis des HK. kurzsh.*; B. längl.-lanzettl., etwas gezähnt, kahl; *Wfasern knollentragend.* 4. Triften, sandige O.; Istrien. Apr. Mai. Leontodon bulbosum L. Aetheorrhiza bulbosa Cass., DC. Bl. gelb.

10. *C. aurea* Cassin. *St. 1köpfig, blattlos* od. an der Basis wenigblättrig u. etwas ästig, *oberwärts nebst dem HK. schwarzrauh*; B. längl., gezähnt od. schrotsägef., kahl.; *Wfasern stielrund.* 4. A. u. VorA. Jul. Aug. Leontodon aureum L. Bl. pomeranzengelb.

11. *C. alpestris* Tausch. *St. 1köpfig, blattlos* od. an der Basis wenigblättrig, etwas ästig, *an der Spitze filzig*; HK. grau od. kurzsh.; B. lanzettl., gezähnt od. schrotsägef. 4. A., VorA. u. Jurakalk in Würtemb., bei Regensb. u. Eichstädt. Jul. Aug. Hieracium alpestre Jacq. Bl. gelb.

12. *C. jubata* Koch. *St. 1köpfig, 1-2blättrig, oberwärts nebst dem Köpfchen dicht rauhh.*, die Haare abstehend, etwas schlängelich, drüsenlos, gelblich; Blättchen des HK. lanzettl., dachig; WB. längl.-lanzettl., stumpf, nach der Basis verschmälert, ganzrandig, od. ein wenig gezähnt, kahl, das stengelst. rauh. 4. Im Thale Bagne im Wallis Em. Thomas. *C. chrysantha* Fröl.

3. *St. beblättert*, an der Spitze ebensträussig. Grösse der Köpfchen bei verschiedenen Arten verschieden. Bth. aller citrongelb od. goldgelb.

13. *C. chondrilloides* Jacq. *St. armköpfig, grau u. drüsig-behaart, unterwärts beblättert*; Köpfchen fast ebensträussig; B. gefiedert, *Fieder büschelig-geht.*, *Zpft. lineal., sehr schmal*; HK. filzig; Achenen 10riefig. 4. Sonnige, felsige O.; Litt., Krain. Jun. Jul. *C. foeniculacea* Froel., DC. pr. *Andryala chondrilloides* Scop.

14. *C. biennis* L. *St. beblättert*, an der Spitze *ebensträussig*; B. gezähnt od. schrotsägef.-fiedersp., die stengelst. sitzend, fast stengelumfassend, flach, *an der Basis gehöhrt-gezähnt*, die