

- β. runcinata* (Frol.) mss. scapo 1-cephalo, foliis runcinato-pinnatifidis. (v. v. s. in Alp. Algov.)
- γ. taraxaciformis* (Frol. mss.), scapo monocephalo humili crassiunculo, capitulo tumido glabriuscule, foliis spathulatis dentatis sessilibus. (v. v. in Taureno Rauviciensi in confinibus Salisburgiae et Carinthiae supra glacies aeternas). An propria species? Flos magnitudine et forma Taraxaci Dentis-leonis, etc., sed crocens, scapus vix bipollucaris crassiunculus ascendens, folia obovato-oblonga vix petiolata, capitulum ovatum crassisculum.
- δ. leiocephala* (Frol. mss.), scapo sub-2-cephalo, involucro glabro. (v. v. in Alp. Algov.)
- ε. Halleriana* (Frol. mss.), scapo diviso dicephalo. Taraxacum calycibus hirsutis squamis rectis Hall. hist. n. 57. t. 1. bon. (v. v. cum priore.)
- ζ. crocea* (Frol. mss.), foliis runcinatis utrinque glabris, caule paniculatio ramoso, ramis longis nudis unifloris calycibus villoso-nigrescentibus.— Scapus 3-4-cephalus subfoliatus: pedunculis elongatis laxiusculis. Flos croceus. Involucri figura et indumentum idem ac in typo. Vix propria species et syn. Gmel. potius H. alpestri Jacq. adscribendum, cum auctor ipse flores flavos praedicat. (v. v. in Taureno Rauvic.) (1).
37. *C. KITAIBELII* (Frol. mss.), scapo 1-cephalo aphylllo foliisque glabris, primordialis integris linearibus, secundariis lanceolatis aentis subruncinato-dentatis, involucro glabriuscule (flor. flavis). \mathcal{U} in Alpibus Croatiae. Hieracium Alpinum Willd. herb. 14635! n. A! Nimirum affinis H. Alpino à quo differt, monente cl. Kitaibeli in litt., flore dimidiò minore constanter flavo, involucro ferè glabro basi tantum pilis raris articolatis adsperso, squamis multò angustioribus linearibus, foliis multò minoribus longè petiolatis. (v. s. sp. comm. à cl. Kit.)
38. *C. HETEROTRICA* (DC. herb.), acaulis, foliis radicalibus linearis-oblängis acuminatis in petiolum attenuatis semipinnatifidis, lobis remotis acuminatis pilis rigidis eglandulosis hirtellis, scapo foliis triplò longiore 1-cephalo scabro, pilis ad apicem et ad involucrum rigidis glanduliferis, invol. imbricato corollis longiore. \mathcal{U} in Oriente ad Alpes Zerokou dictas legit cl. Aucher-Eloy! Hieracium glandulosum Anch. pl. exs. n. 3549 non Schult. Achænia glabra lœvia, Pappus albus multiserialis. Ligulæ flavæ invol. breviores. (DC. v. s. comm. à cl. inv.)
39. *C. ARMENA* (DC. herb.), acaulis breviter glanduloso-pubescent, foliis radicalibus obovatis oblongis in petiolum attenuatis aente inciso-dentatis, scapo nudo aut foliolum lineare integerrimum gerente 1-cephalo, invol. squamis lanceolato-linearibus acuminatis circ. biseriatis. \mathcal{U} in Armeniâ legit cl. Aucher pl. exs. n. 3280! Herba 3-pollicaris Leontodontis facie. (DC. v. s. comm. à cl. inv.)
40. *C. SIMPLEX* (Frol. in litt. 1837), scapo 1-cephalo aphylllo supernè incrassato squamoso, involucro simplici cylindraceo, foliis spathulatis sinuato-dentatis. \mathcal{U} ? in pratis propè Cyrenam Africæ bor. Hieracium simplex Viv. fl. libye. et in bot. zeit. 1825. p. 636. non Lapeyr. Plantam à me non visam huc refero cum auctor fructus subrostratos indicat. An potius Barkhansia species? †.
41. *C. SCHREBERI* (Frol. in litt. 1837), scapo submonocephalo subunifolio, foliis lanceolatis runcinato-pinnatifidis glabris, lacinias linearibus subdentatis mucronatis, involucro simplici scalo cano-tomentoso hirsuto. \mathcal{U} ?.... Hierac. Gmelini Schreb. herb. Habitum affinis H. alpestri Jacq. à quo differt radicis capite albo-villoso, involucro imbricato nec squamis majoribus obvallato, foliorum lacinias dentibusque mucrone albo acuminato terminatis. (v. s. in herb. Schreb.)

(1) Sub nomine Hier. crocei recepi à cl. Turczaninow stirpem in lapidosis Transbaicalensis et arenosis Mongolicis crescentem, variantem caule simplici aut ramoso 1-aut polycephalo, pilis invol. albidis aut nigris. Mihi videtur species propria nempè Hier. croceum Lam. dict. 2. p. 360. Willd. sp. 3. p. 1571. Gmel. fl. sib. a. p. 22. t. 8. f. 1. (DC. v. s.)