

Р. Г. ЭСКЭРОВА

*Crepis*. L. ЧИНСИНИН ЕНИ НӨВҮ

(Азәрбайчан ССР ЭА академики Г. Ә. Әлиев тәрәфиндән тәгдим әдилмишдир)

Тәсвир этдийимиз нөв илк дәфә олараг Ледебуруг тәрәфиндән (Flora rossica II, 827) Нордманын Эрмәнистандан топладығы материал- лара әсасән тапылмыш, лакин сәһв олараг, ялныз Юнаныстанда яйыл- мыш *Crepis incana* Sibith. нөвүнә аид әдилмишдир.

1857-чи илдә Буассе Балансын Фригиядан (Гәрби Кичик Асия) йығылмыш эксикатларында *C. phrygia* нөвүнү тәсвир әтмәйи нәзәрдә тутмушдур. Сонрадан һәммин мүәллиф (Flora orientalis III, 837) нәзәрдә тутдуғу нөвүн мүстәгил олмасыны ә'тираф әдәрәк, ону *C. macropus* Boiss. et Heldr. нөвүнүн вариасиясы кими гәбул әтмиш var. *phrygia* Boiss. вә Нордманын Эрмәнистандан йығдығы һербариләри дә бурая дахил әтмишдир.

А. А. Гросһейм өз әсәрләриндә (Флора Кавказа, IV, 264; Опреде- литель растений Кавказа. 519) *C. phrygia* Boiss. нөвүнү бәрпа әдәрәк Кичик Гафгаз биткиләрини дә бу нөвә дахил әтмишдир. Биз Ленин- градда (Ботаника институтунун һербарисиндә) Фригиядан йығылмыш *C. macropus* Boiss. et Heldr. нөвү вә онун вариасиясы var. *phrygia* Boiss.-нын нүмунәләрини нәзәрдән кечирәркән, онларын Кичик Гаф- газдан бу нөвә аид йығылмыш биткиләрдән айдын сурәтдә фәрглән- дийи мейдана чыхмыш, Кичик Гафгаздан йығылмыш нүмунәләрин әт- рафлы өйрәнилмәси нәтичәсиндә онларын Кичик Асиядан (Фригиядан) йығылмыш нүмунәләрдән фәргли олдуғу тәсдиг әдилмиш вә Гафгаз нөвүнү айырмаға имкан вермишдир. Бу нөвүн тәсвири ашағыдакылар- дан ибарәтдир.

*Crepis kurdistanica* Acker. sp. nova

Planta perennis, pallide—viridis. Caules 40—70 cm alti, erecti, sul- cati solitarii, dichotome—ramosi ramis patentibus, longis, tenuibus, in parte inferiore parce et adpresso pubescentibus superne subglabris. Folia utrinque plus minusve parce adpresso—arachnoidea interdum subglabra; radicalia et inferiora in retiolum angustate runcinato—partita lacinia terminali longiora oblongo-lanceolata sinuato—dentata, si lateralibus e basi triangulari lanceolatis; folia media minora sessilia basi auriculis triangulare—lanceolatis minuta, superiora anguste linearia, denticulata

*vej integerrima. Calathidia solitaria longa pedunculata, involucrem obconicum ad 12 mm. lat.; phyllis albidol anato tomentosus interioribus oblongo-linearibus, obtusiusculis dorso linea nigra, exterioribus lanceolatis inferioribus bi-triplo brevioribus. Achenia 5—6 mm. long. oblongo-cylindrica fuscata sulcata, laevia, subconcava, pappus albus, achenio sesqui longior. Fl. VII—VIII, fr. VIII—IX.*

Habitat in regione subalpina et media montana Caucasi Minoris.

Typus. Transcaucasia, Aserbatdshania, Kurdistania ad thermas Istisu super. in lapidosis. 4. VIII 1934 leg. C. Gurvitsh. In Herbario Inst. botan. nom. V. Komarovii Ac. Sc. Aserb. RSS. in Baku conservatur.

Affinitas. A C. *Phrygia* Boiss. differt foliis caulinis (non rosantibus), pilorum strigosorum ad nervum medium in pagina inferiore foliorum defectu, foliis runcinato-partitis (non interrupte partitis); a *Crepis sonchifolia* M. B. altitudine, foliis caulinis (non rosantibus), foliis pinnatisectis (non lyratis), segmentis foliorum, pilis strigosis in phyllis interioribus deflectionibus.

Күрдүстан чобан күлү чохилик солгун биткидир. Көвдәси 40—70 см һүндүрлүкдә олуб, тәк вә я да 2—3 зәғлүдүр, шырымлы, дихотомик будаглыдыр, будаглары әйилиб-галхан узун вә назикдир. Ашағы һиссәси зәиф вә дағылмыш ятыг торлу түклүдүр, юхарыдан исә, демәк олар ки, чылпагдыр. Ярпаглар көвдәнин һәр ериндә ерләшәрәк аз вә я чох ятыг торлу түклүдүр. Көкяны вә ашағыдакы көвдә ярпаглары узунсов-лансетваридир, саплаглыдыр, дәрин бөлүнмүшдүр, юхары сегменти ири, узунсов-лансетваридир. Янлардакы сегментләр исә аралы үчбучагы гайдәсиндән башлаяраг лансетвари, янлардан кәмирилмиш дишлидир, саплагын гайдәсинә яхынлашдыгча балачалашыр, ортадакы ярпаглар чох хырда, саплагсыз, гайдәсиндә үчбучаг-лансетвари гулагчылары вардыр. Юхарыдакы ярпаглар дар хәтли, хырда дишли, ихуд там кәнарлыдыр. Сәбәтләри тәк-тәк олуб, узун чичәк саплагы үзәриндәдир, саргы ярпагчыгы конусвари формададыр, 12 мм-ә гәдәр узунлуғу вә 10—15 мм әни олур, ағымтыл юнлу-кечә түклүдүр. Дахили ярпагчылары узунсов, хәтли, күтвари, арха тәрәфдән назик гара хәтлидир. Харичдәки ярпагчыглар лансетвари, арха тәрәфдән гара галын гылчыгларла өртүлүдүр, дахили ярпаглардан 2—3 дәфә гысадыр. Тохумча узунсов-силиндрик, боз шырымлы, һамар, азачыг чухурдур. Учаған ағдыр. 1,1 дәфә тохумчадан узундур. ч., VII—VIII. м., VIII—IX. Кичик Гафгазын орта вә юхары дағ гуршагларында яйылмышдыр.

Тип. Загафгазия—Азәрбайчан, Күрчүстан, Юхары Исти-су яхынтығында, дашлы ямачларда, IV—VIII—1934, С. Гурвич.

Азәрбайчан ССР Элмләр Академиясы В. А. Комаров адына Ботаника институтунун һербарисиндә (Бақы шәһәри) сахланлыыр.

Тәдгиг әдилмиш нүсхәләр.

Азәрбайчанда: Күрдүстан, Ашағы Исти-Су, исти булагын янында, ашлы, отлуглу ямачларда, 27/VII—1934, ч., С. Гурвич.

Гарабағ—Сағсаған дағында, 8/VIII—1929, ч., А. Колаковски. Эрмәистан ССР: Нор-Баязед. Шаһ дағдан чәнуба, 25/VII—1928, ч. вә м., 1. Зеделмеер вә Т. Нейдман; Севан көлү, Куней, Бабадаян—дәрәнин чында, 29/VII—1927, ч. вә м., А. Шелковников вә Е. Гара-Мурза.

Гоһумлуғу: бизим нөв *Crepis phrygia* Boiss. нөвүндән ашағыкы хүсусийәтләринә көрә фәргләнир:

Харичи көрүнүшү, ярпагларынын көвдәнин һәр тәрәфиндә ерләшәси, ярпагларынын ашағы һиссәдән орта дамарын гылвари түкләрин имамасы вә рәндәвари бөлүнмүш ярпаглары илә. Әйни заманда бизим

нөв Бэйүк Гафгазда яйылмыш *Crepis sonchifolia* M. В. нөвүн чэнуб ирги олараг, ондан ашагыдакы хүсусийятлэрэ көрө сечилир, даһа узун бою илэ, яргаглары көвдэниң үзэриидэ һәр тэрэфдэ ерлэшмэси, дэлэқвари ярылмыш яргаглары, яргагларының сегменти вэ сарығының даһили яргагларында гылчығын олмамасы илэ.

Ботаника Институту

Алынмышдыр 17. III 1958

Р. К. Аскерова

Новый вид рода *Crepis* L.

РЕЗЮМЕ

Установленный вид впервые был отмечен еще Ледебуром (*Flora rossica* II, 827) по сборам Нордмана из Армении, который, однако, отнес его к *Crepis Incana* Sibth., распространенному, вероятно, только в Греции. Позднее, в 1857 г., Буассье в эсикатах Баланса из Фригии наметил вид *Crepis phrygia*. Впоследствии (*Flora orientalis* III, 837), не признав самостоятельности намеченного вида, он отнес его к *C. macropus* Boiss. et Heldr. (*v. phrygia*), присоединив сюда и нордмановские сборы.

А. А. Гроссгейм в своих работах восстановил *C. phrygia* Boiss. и отнес к нему и малокавказские растения.

Просмотренные нами в Ленинграде в Гербарии Ботанического института АН СССР образцы *C. macropus* Boiss. et Heldr. из Малой Азии и его вариации *v. phrygie* Boiss. из Фригии явно отличаются от наших малокавказских растений. Дальнейшее подробное изучение последних позволило установить отличия их от малоазиатских и выделить кавказский вид.

Наш вид распространен в среднем и верхнем горном поясе Малого Кавказа. От *C. phrygia* Boiss., к которому раньше относился наш вид, внешне отличается расположением листьев по всему стеблю (а не розеткой у основания стебля), отсутствием щетинистых волосков по средней жилке на нижней стороне листьев, струговидно-рассеченными листьями (а не прерывисто струговидно-рассеченными).

От распространенного на Большом Кавказе *C. sonchifolia* M. В., южной расой которого и является наш вид, отличается более высоким ростом, расположением листьев по всему стеблю, перисто-рассеченными (не лировидными) листьями, сегментами листьев, отсутствием щетинок на внутренних листочках обертки.