

FRUCTITUBIA SYNANTHERIÆ. LACTUCEÆ. Batkhausia. 464

671 prostrata : caulis munerosis prostratis ; foliis radicalibus caulinis que inferioribus runcinato pinnatifidis, pilosis, acutis, superioribus dentatis integris; pericliniis glanduloso-pubescentibus (2). 6—8. In ruderatis siccis! Crepis prostrata, nob. in litt.

672 gracilis. = Crepis Lej! (1)? ;. In pratis Luxemb. (Tinant!)

673 taraxacifolius, Dec (2). 5 In pratis siccis Flandriæ. (Hoor!)

674 Leontodontoides. = Crepis, All. (2). 5—7. In rupestribus Tornaci!

CREPIS. Moench. Cass.

§. 1. CREPIDOPSIS. — Clinanthium paleolatum.

675 biennis, L! (2). 5—8. In pratis et ad vias!
β. scabra.

676 lævigata : caule erecto, foliisque lævissimis glabris, radicalibus runcinatis vel runcinato pinnatifidis, summis lanceolatis; pericliniis costatis muricatis. (2). 5—7. In rupestribus Tornaci!

§. 2. CREPIDOTYPUS. — Clinanthium alveolatum.

677 polymorpha, Wallr. = C. Tectorum, L! pro parte (1). 6—9.
α. stricta.

β. virens.

γ. diffusa.

δ. uniflora.

678 tectorum, L. pro parte. (1). 6—9. In ruderatis et agris!

β. segetalis.

γ. lachenalii.

δ. cinerea.

§. 1. PHÆCASIUM. Cass.

679 pulchra, L! (1). 5, 6. In aggeribus Mosellæ!

TARAXACUM. Juss. Dec. Cass.

680 Leontodon. ♀. 5—9. In pratis et pascuis!

β. laciniatum.

681 arcuatum = Leont., Boen. ♀. 5—8. In pasc. sabul. (Tin!) Seq. var?

682 palustre, Dec. ♀. 6, 7. In prat. humid. Malmund. (Lib!)

683 salinum = Leontod. Poll. ♀. 5—6. In paludibus steril.! .

HELMINTHIA. Juss. Cass.

684 echioides, Gærtn. (1). 6, 7. In dumetis argill. littoral!

PICRIS. Juss. Cass.

685 hieracioides, L! ♀. 7, 8. In ruderatis argill. et glareos !