

Crepis sprengeriana. *Allion. pedem. n. 810.* *

Hieracium (sprengerianum) caule ramoso folioso, foliis amplexicaulibus oblongis repandis hispidis. *Sp. pl. 1130. Roy. lugdb. 123.*

Hieracium pulchrum ramosum sprengerianum. Bauh. hist. 2. p. 1026. Moris. hist. 3. p. 65. f. 7. t. 5. f. 17.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 84.

Ausgebreiteter Pippau. W.

Habitat in Lusitania, Italia. ☉ (v. v.)

- *Caulis pilis raris rigidulis, ramis alternis brevioribus simplicibus. Folia amplexicaulia ovata obtusiuscula ciliata, rarius pilosa, subtus magis. Calyces terminales plures pedunculati, sparse pilosi.*

16. *CREPIS aspera.*

C. foliis amplexicaulibus inferioribus oblongis dentatis, superioribus inciso-dentatis, caule setoso-hispido, calycibus fructigeris angulatis muricatis, squamis exterioribus membranaceis ovatis deciduis. W.

C. foliis dentatis: inferioribus ovatis auriculatis: superioribus sagittatis, caule setis rigidis sparsis. *Sp. pl. 1132.*

Hieracioides sicula, cichorii folio, flore parvo flavescente. Vaill. act. 714.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 92.

Scharfstieliger Pippau. W.

Habitat in Oriente, Sicilia, Palaestina. ☉ (v. v.)

Caulis nudus ramosus, asper: setis subulatis, rigidis, sparsis, patentibus. Flores fere cymosi pedicellis rigidis, subsessiles, alterni, excepto ultimo. Calyx parvus, ovatus, torulosus, hispidus: exterior brevior foliolis ovatis, membranaceis, deciduis.

* 17. *CREPIS lappacea.* W.

C. foliis sessilibus hispidis oblongis sinuato-dentatis caule hispido, ramis unifloris, pedunculis incrassatis, calycibus fructigeris angulatis, squamis exterioribus linearibus setoso-hispidis. W.

Klettenartiger Pippau. W.

Habitat — — — — — ☉ (v. f.)

Caulis erectus pedalis et ultra hispidus pilis glochidibus tectus, ramis alternis unifloris. Folia, ut caulis, pilis glochidibus obsita, radicalia petiolata oblongo-

obovata dentata, caulina sessilia, inferiora oblonga obtusa repando-dentata, superiora lanceolata, summa integerrima. Pedunculi uniflori tumidi hispidi Calyces fructigeri ovati angulati hispidi, squamis exterioribus linearibus. Similis sequenti, sed folia non recurvato-dentata, pedunculi tumidi, et pili calycis non clavati. W.

18. CREPIS rhagadioloides.

C. foliis amplexicaulibus subflagittatis lanceolatis recurvato-dentatis, ramis simplicibus alternis, calycibus fructigeris ovatis angulatis hispidis, pilis clavatis. W.

C. foliis integris amplexicaulibus oblongis, calycibus interioribus toruloso-articulatis hispidis: foliolis cymbiformibus. *Mant.* 108.

C. foliis oblongis dentatis, inferioribus versus basin longe angustatis, superioribus sagittato-amplexicaulibus, calycibus inferioribus torulosis cum pilis apice clavatis. *Jacq. hort. schoenb.* 2. p. 9. t. 144. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 92.

Sichelsalatartiger Pippau. W.

Habitat in Hispania prope Malagam. ☉

Caulis semipedalis, erectus, striatus, scaber, ramosus. Folia oblonga, integra, amplexicaulia, laevia. Pedunculi elongati, scabri, uniflori, nudi. Calyx calyculatus. exterior foliolis plurimis, linearibus, obtusis, calyce $\frac{1}{2}$ brevioribus, insertione inaequalibus; Interior torulosus, sectusque in 13 partes parallelas, quarum quodvis foliolum cymbiforme compressum, dorso hispido aculeolis glochidibus. Corolla lutea extus purpurascens. Semina omnia Pappo piloso. H. U.

* 19. CREPIS virgata.

C. foliis lanceolatis denticulatis subpubescentibus, superioribus linearibus subintegerrimis sessilibus, caule virgato, calycibus tomentosis. W.

C. (*virgata*) glabra, caule superne nudo, pedunculis lateralibus paucis, centrali longioribus, foliis dentatis petiolatis, inferioribus lato-lanceolatis. *Desfont. act. Soc. hist. nat. Paris.* 1. p. 37. t. 8. *

C. glabra, caule superne nudo, pedunculis subumbellatis superne squamulosis, lateralibus centrali longiori-