

stis simplicibus. *Crepis rubra* Linn. *Hostia rubra* H. Cass. *Crepis incarnata* Vis. secund. specimina Petteriana. Flos. rosei. — Um Nizza, in Dalmatien längs der Küste an Feldrainen, auf der Insel Cherso: Saderler. — Juni. Juli. ◎

1683. *B. foetida* Dec. foliis Jacerato-pinnatifidis hispidis, summis lanceolatis basi incisis, pedunculis elongatis erecto-patulis anthodiisque glanduloso pubescentibus. *Crepis foetida* Linn., Engl. Bot. 406. Gärtn. 2. t. 158. f. 8. *Hostia foetida* Muech. Odor sere tritorum foliorum Pruni Padi, ut in sequentibus, flosc. flavi. — Auf trocknen Hügeln und Felsen, Schutt, besonders Kalkboden. — Juni — Aug. ◎

1684. *B. graveolens* Rchb. foliis obovatis runcinato-dentatis hastato-triangularibusque sinuato-dentatis lucidis, pedunculis corymbosis. *Borkhausia graveolens* Lk., Wiesb. graveolens. Fl. Wett. I. Inflorescenzia foliisque etiam in statu maioresce

CCCXXXVI. *Crepis* L. *Pippau*. Anthod. o squamis plur. aequalibus, baseos accessoriis numerosis. Rec. nudum. Achen. fusiformia truncata, pappus sessilis pilosus lacteus vel candidus.

a. *Phaeasium* H. Cass. squamis accessoriis subuniserialibus adpresso, flosc. biseriales:

1687. *Cr. pulchra* L. foliis radicalibus spatulatis, caulinisque ovato-lanceolatis sinuato-dentatis, panicula corymbosa nulla, pedunc. uncinatus elongatis adscendentibus. *Prey. heteracifolia* Willd. Schk. t. 222. *P. viscosa* Baumg. *Phaeasium lampsonoides* H. Cass. Stricta gracilis pedalis-bipedalis, pallide virens, basi glandulosa-villosa, folia tenerima, corymbus divergenti-diffusus. — An Wegen, auf Schutt im ganzen südlichen Gebiete, im mittlern Gebiete hier und da, in d. Brühl b. Wien: Doll. im Badenschen. — Jul. Aug. ◎

b. *Crepis* H. Cass. squam. access.

1689. *Cr. tectorum* L. annua, glabriuscula, foliis radicalibus auncinatis, caulinis linearis-lanceolatis sagittatis, corymbis incano-tomentoso. Fl. D. 501. Schk. t. 222. Var. *C. segetalis* Roth. stricta Schlk. virens Vill. Dec. fol. rad. sinuato-dentatis. Spilhamaea-pedalis, in pinguis agris altior. — Auf Mauern, Schutt, Ackerw. — Juni. Juli. ◎

1690. *Cr. vires* L. foliis glabris, inferioribus remote dentatis run-

distincta. — Standorte sind noch von denen der vorigen zu sondern. — Juni — Aug. ◎

1685. *B. pinguis* Rchb. diffusa, foliis lanceolatis runcinato-pinnatifidis obovatisque, caulinis hastato-lanceolatis utrinque hispidulis, pedunculis elongatis anthodiisque glanduloso-pubescentibus. *Crepis glandulosa* Bast. non Guss. *Chondrilla Drenandollit* Spr. olim. Folia crassiuscula quasi inuncta, illis praecedentium multo latiora. — Wahrscheinlich hier und da in Kalkgegenden, meine Exemplare aus der Gegend von Cöleda in Thüringen. — Mai-Jul. ◎

1686. *B. rhœadifolia* M. B. diffusa, scabra, foliis runcinatis laciniosque acuminatis acute dentatis, anthodiis eglandulosis villoso-hispidis. *Crepis rhœadifolia* M. B. Barkhausia — M. B. suppl. — Mähren, an steinigen Hügeln u. Rainen b. Brünn, Crep. foetida: Hochst. in Böhmen bei Prag, Cr. foet.: Mann. — Mai — Juli. ◎

1688. *Cr. lapsanifolia* Rchb. foliis radicalibus spatulatis runcinatis, caulinis sagittato-ovatis angulato-dentatis; panicula corymbosa, pedunculis ramosis rectis. *Crep. pulchra* Linn. Hierac. leptomacrocaulos Col. Euphr. t. 249. opt. Bipetalis et ultra, robustior obscure virens, basi brevissime pubescens, folia Geraci paludosae, crassiore, runcinata, panicula corymboso-composita, ramositer situata peduncularum recto distinctissima. — In Ungarn und in Oberitalien. — Juli. Aug. ◎

1691. *Cr. agrestis* W. Kit. caule erecto, foliis lanceolatis runcinatisque, superioribus pinnatifidis integrerimisque subsagittatis, caule ramoso, anthodiis virantibus vix tomentosis. Var. α . *capillaris*: *Lapsana capillaris* L. *Crep. diffusa* Dec. β . *pinnatifida*: *C. pinnatifida* Willd. *C. tectorum*, Engl. Bot. 4111. Curta Lond. II. t. 162. — An Feldrainen, Wegen, Wiesenrändern, grasigen Hügeln. — Juli—Sept. ◎

1691. *Cr. agrestis* W. Kit.