

3? uniflora, fol. sinnato-runcinatis integris glabris, scapo fol. subaequali unifloro. Thuiill. l. c. p. 410. Hab. circa Parisios in sylvula Boulogne et Vincennes.

* *umbellata*, fol. sub lanceolato-spatulatis subacutis deorsum longissime angustatis, inaequaliter repando-denticulatis, inaequaliter repando-denticulatis, scapo apophylo apice umbellifero, flor. brevi-pedunculatis : centrali sessili. Thuiill. p. 409. Hab. in pratis siccis.

3g. hirta, caul. basi nudo, flor. sub-umbellatis, fol. pinnatifidis dentatis. Willd. Sp. III. p. 1614. sub *Ryoseri*. Hab. . Cal. farinosi. Fol. radicalia copiosa.

3h. Dioscoridis, fol. radicalib. lyrato-runcinatis, caulinis hastatis lanceolatis, inferiorib. dentatis, caule erecto, ramis divaricatis, calycib. tomentosis, fructigeris subrotundo-ovatis angulosis. Willd. Hab. in Gallia, Germania, Sibiria, Palauinatu. Cal. farinosi. Pedunc. tumidinsculi.

3i. coronopifolia, fol. pinnatifidis, lacinias linearibus, radicalibus dentatis, caulinis integerrimis, caule paniculato, calycib. tomentosis, exterioribus adpressis. Willd. Desf. in Act. Soc. C. succulenta. Ait. Kew. 3. p. 128? Chondrilla hieracoides. Roth. catal. bot. 1. p. 101. Hab. in Canaria.

3j. tenuifolia, fol. pinnatis, foliolis filiformibus, radicalib. dentatis, caule paniculato, calycib. pubescensibus, exteriore reflexo. Willd. p. 1606. Hab. in Tauria. Valde Similis praecedenti. W. T.

3k. filiformis, fol. lineari-filiformib. integerrimis glabris, papo sessili. Ait. Kew. 3. p. 128. Hab. in Madera. ♂

3l. macrophylla, fol. inferiorib. ovato-oblongis pilosis inaequaliter dentatis, papo stipitato simplici. Desf. atl. 2. p. 281. Hab. in Algeria, ad agrorum limites. Fol. hispida, inferiora 6 vel 8-pollicaria inaequaliter dentata. Cal. laxus glaber, squamis ovatis. W.

3m. latifolia, fol. radicalibus obovatis latissimis dentatis sebris, caulin. sulcatis, plicatis, acuminatis, calycib. farinosis, pedunc. bracteatis. Ex H. Taurin. misit cl. Balbis. Pl. videtur rufa. Caul. sulcatus. Cor. magna. Pedunc. juniores et cal. squamae subiomentosae. †

Obs. Sub genere *Borkhausia*, species n^o. 3, 8, 9, 13, 14 et 20, conjunctae sunt a cl. Decandoli, praeante b. Moenchio, secundum characterem genericum sequentem : *Cal. calyculatus*, maturus sulcate-

costatus : squamis exteriorib. laxis. *Recept. nudum*. *Pappus stipitatus*, pilosus. — Primae ceterum Crepides vix ab Hieraciis separandae.

1775. TOLPIS. *Cal. calyculatus*, squamis laxis subulatis, calyce sublongioribus. *Recept. favosum*. *Pappus setosus* : marginalis dentiformis. (*Pedunc. incrassati*.)

1. *barbata*, fol. oblongis dentatis, pedunculis unifloris. Gaertn. sem. a. p. 372. t. 160. f. 1. Lam. ill. t. 651. *Crepis barbata*. L. *Drepania*. Juss. Hab. in Monspelii, Vesuvii, Siciliae, Messanæ arenosis maritimis. Var. flor. pallidis. ♂

2. *umbellata*, fol. lanceolato-oblongis, inferioribus sinuato-dentatis, pedunc. proliferis. *T. umbellata*. Bettoloni Pl. genuensis, ex Balbis. Hab. circa Genuam. Var. prioris? Flor. multo minores, in pedunc. subfiliformibus, apice tomentosis.

3. *altissima*, fol. oblongis linearib. scabris dentatis, caul. ramosissimo divaricato, squamis inferioribus cal. tomentoso brevioribus. *Crepis ambigua*. Balbis. Diss. p. 4. t. 1. *C. altissima*. Ej. Cat. Hort. Taur. p. 15. *C. ambigua*. Decand. Flor. frang. a. p. 40. Hab. in incultis et ad margines agrorum Pedemontii. Facie et recept. alveolato hujus generis. Antecedenti affinis. Cor. sulphurea.

1776. ANDRYALA. *Cal. multipartitus*, subaequalis, rotundatus. *Recept. villosum*. *Pappus simplex*, sessilis. *Sem. sulcata*, (Fol. pilis plumosis tomentosa.)

* *Seminibus omnibus papposis*.

1. *cheiranthifolia*, fol. glanduloso-tomentosis : inferioribus runcinato-dentatis, summis ovato-lanceolatis integerrimis, canle pedunculisque villoso-glandulosis. Willd. p. 1609. *L'Herit. stirp.* p. 35. t. 18. Lam. ill. t. 657. f. 1. *A. glandulosa*. Lam. enc. 1. p. 153. *A. tomentosa*. Scop. insub. 2. p. 12. t. 6. Hab. in Madera. T.

2. *pinnatifida*, fol. pinnatifidis, calycib. tomentosis pilosis, pilis rigidiusculis. Ait. Kew. 3. p. 129. ♂. A. fol. profunde pinnatifidis, pinnis brevibus integris. Ait. Kew. 3. p. 129. Hab. in Madera, in Canariis. ♂

3. *crithmifolia*, fol. pinnatis linearibus. Ait. Kew. 3. p. 129. Hab. in Madera; ♂

4. *nigricans*, fol. pinnatifido-lyratis, flor. corymbosis aggregatis, pedunc. caly-