

328. *CREPIS*. Recept. nudum. Cal. calyculatus squamis deciduis. Pappus plumosus stipitatus.

CRÉPIDE. Réceptacle nu. Calyce ayant à sa base des écailles caduques. Aigrettes plumeuses et pédiculées.

*FETIDA*. 1. *C. foliis runcinato-pinnatis hirtis, petiolis dentatis*. Linn. sp. pl. 1133. Vaill. Par. 189. Dalib. Par. 238. Moris. hist. 3. s. 7. t. 4. f. 4.

*Habitat ad versuras. Flores lutei; Julio, Augusto.* ☉

1. CRÉPIDE FÉTIDE. Feuilles découpées profondément, de manière à paroître ailées, et dont la surface est hérissée de poils. Pétioles dentés. Fleurs jaunes; en Juillet et Août. Se trouve sur les bords des chemins et fossés.

*TECTORUM*. 2. *C. foliis lanceolato-runcinatis sessilibus lævibus: inferioribus dentatis*. Linn. sp. pl. 1135. Dalib. Par. 238. Vaill. act. 1718. Moris. hist. 3. s. 7. t. 7. f. 29.

*Habitat in aridis, in tectis. Flores idem; Augusto, Septembri.* ☉

2. CRÉPIDE DES TOITS. Feuilles sessiles, lisses, profondément découpées vers la base, et lancéolées vers le haut; les inférieures dentées en leur bord. Fleurs jaunes; en Août et Septembre. Se trouve au Mont-Valérien et plaine de Nanterre.

*LINIFOLIA*. 3. *C. caule erecto: foliis angusto-lineariibus, integris: corymbo paucifloro; pedunculis unifloris, longiusculis.*

*Habitat in locis sterilibus. Flores idem; Julio.* ☉

3. CRÉPIDE A FEUILLES LINÉAIRES. Feuilles entières. Corymbe pauciflore. Pédoncules un peu longs, ne portant qu'une

seule fleur de couleur jaune; en Juillet. Se trouve dans le parc de Vincennes.

*BIENNIS.* 4. *C. foliis runcinato - pinnatifidis scabris : basi supernè dentatis, calycibus muricatis.* Linn. sp. pl. 1136. Vaill. act. 1718. Vaill. Par. 103. Bauh. hist. pl. 2. p. 1025. ic.

*Habitat in pratis humidis. Flores idem; Maio, Junio. ♂*

4. CHICORÉE D'HIVER. Feuilles à coupures profondes qui les font paroître ailées; ayant leur surface glabre et leur base dentée. Calyces garnis d'écaillés en chausse-trape. Fleurs jaunes; en Mai et Juin. Se trouve dans les prés humides.

*TARAXACIFOLIA.* 5. *C. caule assurgente, puberulo : foliis hirsutatis, subsulcato-runcinatis, dentatis : floribus corymbosis : calycibus albidò-pulverulentis.*

*Habitat in pratis artificiosis. Flores idem; Aprili, Maio. ♂*

5. CRÉPIDE A FEUILLES DE PISSENLIT. Tige redressée, peu élevée, finement pubescente, verdâtre. Feuilles roncées, à lobes recourbés et dentés. Calyces comme pulvérulents-blanchâtres. Fleurs en corymbe et jaunes; en Avril et Mai. Se trouve dans les prairies artificielles.

*VIRENS.* 6. *C. foliis runcinatis glabris amplexicaulibus, calycibus subtomentosis.* Linn. sp. pl. 1134. Vaill. Par. 102. Tournef. Par. 99.

*Habitat in agris. Flores idem; Junio, Julio. ☉*

6. CRÉPIDE VÉNÉNEUSE. Feuilles profondément découpées, glabres et amplexicaules. Calyce un peu cotonneux. Fl. jaunes; en Juin et Juillet. Se trouve dans les lieux cultivés.

Obs: Le caractère le plus tranchant pour séparer ce genre du précédent, consiste dans la blancheur de l'aigrette qui est à poils simples.

*UMBELLATA.* 7. *C. foliis sublanceolato-spathulatis, sub-acutis, deorsum longissimè angustatis, inæqualitè repando-*