

basim pinnatifidis apice hastato - acutis sub nervo tantum pilosiusculis, supremis hastato-linearibus subintegerrimis, floribus parvis luteis paniculato-corymbosis subpulverulentis, akenio lævi striato, calathidæ foliolis adpressis. *All. Fl. ped. p. 13. Wild. Spec. 3, p. 1592.*

Cette espèce se reconnaît facilement à sa racine épaisse, ordinairement pivotante, qui produit un grand nombre de feuilles étalées sur la terre en une large rosette; ces feuilles sont parsemées de quelques poils sur la nervure, longues, fortement pinnatifides vers la base, roncénées ou seulement dentées au sommet, qui se termine en fer de lance. Au milieu d'elles s'élève une tige haute de douze à quatorze pouces au plus, anguleuse, striée, assez épaisse, un peu velue inférieurement et de couleur rougeâtre; cette tige se divise presque aussitôt en branches droites, alternes, qui parviennent toutes au même niveau, et paraissent nues, parce que leurs feuilles sont allongées, linéaires, les plus inférieures étant seulement incisées près de la base. Les fleurs semblent d'autant plus petites que la tige est proportionnellement épaisse et que les feuilles sont longues et larges. La graine est striée, lisse, et son aigrette blanche, sessile. Elle fleurit en juin et se trouve au bord des prés et des bois. ♂. Peu commune.

5. *C. longepinnatifida* N. glabra, caule crassiusculo valde striato folioso superne ramoso, foliis infimis longis erectis pinnatifido-acuminatis, pinnis elongato-dentatis acutis, foliis supremis anguste auriculatis basi que pinnatifidis, floribus parvis luteis corymbosis vix pulverulentis, akenio lævi striato.

La crépide à longues pinnules vient sur le bord des prés et des chemins. Elle a une racine pivotante qui donne naissance à une tige feuillée, cylindrique, glabre, épaisse, fortement striée et haute de dix-huit pouces. Toutes les feuilles sont acuminées et découpées en pinnules allongées, étroites, surtout dans les inférieures, où elles portent des dents aiguës près de la base, et où la nervure principale présente en dessous quelques poils épars; les supérieures, également pinnatifides, embrassent la tige et ont deux oreillettes linéaires fort prononcées. Les fleurs sont jaunes, petites, à peine pulvérulentes et disposées en une panicule en forme de corymbe. ☉?

6. *C. patula* N. glaberrima e basi ramosa, caulibus erectis striatis passim foliosis ramosis, foliis angusto-lanceolatis acutis, infimis pinnatifidis, supremis runcinato-dentatis dentibus remotis acutis, floribus luteis parvis paniculatis subpulverulentis, akenio striato lævi.