

- patulo, foliis runcinato-pinnatifidis lanatis sessilibus, summis lanceolatis, involucris densissimè lanatis. (1) in Enbœa.
65. *C. INTEGRIFOLIA* (Vest in florâ 1820. p. 7), caule ramoso sulcato folioso corymboso, ramis suprà capitula centralia præcociora elatis, foliis integris et integerrimis glabris lanceolatis sessilibus, invol. pubescentibus squamis accessoriis filiformibus. — patr. ign.
66. *C. LÆVIGATA* (Dumort. fl. belg. prod. 61), caule erecto foliisque lœvissimis glabris, radicalibus runcinatis vel runcinato-pinnatifidis, summis lanceolatis, invol. costatis muricatis. (2) in Belgii rupestribus propè Tornacum.
67. *C? LAPPACEA* (Willd. sp. 3. p. 1599), caule erecto hispido, ramis 1-cephalis, foliis sessilibus hispidis oblongis sinuato-dentatis, pedunculis incrassatis, invol. fructiferis angulatis, squamis exterioribus linearibus setoso-hispidis. (1) patr. ign. An potius Endopterae spec. Affinis E. Dioscoridis?
68. *C. MACROCEPHALA*, foliis radicalibus oblongis denticulatis, caulinis inferioribus sessilibus oblongis dentatis, superioribus lanceolatis integerrimis sagittatis, involucro adpresso cauleque hirsutis. (2) patr. ign. C. grandiflora Willd. enum. suppl. 56. non Froel. Facies C. Sibiricæ. Caulis sulcatus, Capitula magna corymbosa.
69. *C? MULTIFLORA* (Sibth. fl. græc. t. 306. ex prod. 2. p. 138), caule ramosissimo, foliis amplexicanilibus runcinatis glabris, superioribus sagittatis, invol. setosis. (1) in campis Thraciæ? An forte Barkhausiæ sp.? Affinis B. setosæ.
70. *C. NIGRICANS* (Viv. fl. libyc. 51. t. 10. f. 3), setuloso-hispida, caule erecto divaricato-ramoso, foliis caulinis lanceolatis amplexicaulibus inciso-dentatis, summis integerrimis, invol. cylindrico setis nigrellis hispidulo, squamis calyculi linearibus acutis patentibus. — in montibus Cyrenaicæ. Pappus dicitur sessilis pilis densissimis simplicibus, ergò ad Picridium ut voluit Sprengel non referenda.
71. *C. PANICULATA* (Presl fl. sic. p. xxxi), caule erecto basi lanuginoso, foliis lyrato-pinnatifidis glabris, lobis omnibus conformibus lanceolatis sinuato-incisis acutis, infimorum lobo terminali maximo triangulari rotundato; capitulis paniculatis, pedicellis villosulis, involucro tomentoso-canescente, calyculo adpresso. — in Siciliâ. Cæt. ign.
72. *C. PUNGENS* (Desf. hort. par. ex Pers. enh. 2. n. 20), foliis oblongis laciniatis glabris rachi cauleque setoso-hispido, capitulis subcorymbosis, non nullis sessilibus, invol. muricatis subfarinosis. — patr. ign.
73. *C. RADICATA* (Sibth. fl. græc. t. 800. ined. ex prod. 2. p. 136. non Forsk.), scapis 1-cephalis foliolosis, foliis radicalibus runcinato-lyratis scabris, involucro tomentoso, squamis exterioribus laxiusculis. (2) in arenosis maritimis ad Pontum Euxinum propè Fanar. Crep. Thracia Spreng. syst. 3. p. 634. Cr. radicata Forsk. est Picridis sp.
74. *C. SAGITTATA* (Wend. ind. sem. h. marb. 1829 ex Linnaæa 1830 litt. p. 54), caule erecto firmo supernè subcorymboso ramoso glabro, foliis inferioribus longis in petiolum decurrentibus, super. sagittato-amplexicaulibus, omnibus inæqualiter dentatis glabriusculis, invol. setoso. (2) patr. ign. An eadem ac C. grandiflora?
75. *C. TRIANGULA* (Presl fl. sic. p. xxxi. del. prag. (1822) p. 110), caule scapo adscendente subaphyllo basi petiolisque hirsuto apice polycephalo, foliis lyrato-pinnatifidis, lobo terminali triangulo, invol. glaberrimi squamis laxis. (1) in pratis montanis propè Panormum Siciliæ. Capitula parva ferè Barkhausiæ Leontodontis, imò minora. Achænum erostre (ex Presl), nec ut in eâ breviter rostratum. An certè diversa?

++ *Species exclusæ.*

*C. ALBIDA* Vill. — Barkhausia albida.