

**542. SONCHUS (LAITERON) L.; Gr., G.** — Ach. à côtes, subatténués ou tronqués au sommet, avec aig. de poils simples. Clinanthe nu. Péricline à folioles  $\times$ -sériées.

- |   |   |  |                            |
|---|---|--|----------------------------|
| 1 | { | Pédoncule glabre. . . . .                          | 2                          |
|   |   | Pédoncule poilu. . . . .                           | <b>1616. S. arvensis.</b>  |
| 2 | { | Feuilles caulinaires à oreilles aiguës. . . . .    | <b>1615. S. oleraceus.</b> |
|   |   | Feuilles caulinaires à oreilles arrondies. . . . . | <b>1617. S. asper.</b>     |

\* Feuilles caulinaires à oreilles aiguës.

**1615. S. oleraceus (L. oléracé) L.; Gr., G.** — Feuil. variables, d'un vert mat, glauques en dessous. Calathides à fl. jaunes, en ombelle irrégulière au sommet des rameaux.

①. Jn-Sept.

Lieux cultivés : Vic. C.

\*\* Feuilles caulinaires à oreilles arrondies.

— Oreilles non contournées en hélice.

**1616. S. arvensis (L. arvense) L.; Gr., G.** — Feuil. roncinnées ou pennatifides, subglauques. Calathides à fl. jaunes, en corymbe.  $\sphericalangle$ . Jn-Jt.

Lieux cultivés, décombres, murs : Vic ; Tarbes, Bagnères (Corb.). CCC.

— Oreilles contournées en hélice.

**1617. S. asper (L. âpre) Vill.; Gr., G.** — Feuil. entières ou dentées. Calathides à fl. jaunes, en ombelle irrégulière au sommet des rameaux. ①. Jn-Sept.

Lieux cultivés : Vic. C.

**545. CREPIS (CRÉPIDE) L.; Gr., G.** — Ach. à côtes ou à stries, atténués au sommet, avec aig. de poils. Clinanthe glabre ou velu. Péricline à folioles  $\times$ -sériées.

- |   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| 1 | { | Tige nue. . . . .   | <b>1622. C. aurea.</b>       |
|   |   | Tige feuillée . . . . .   | 2                            |
| 2 | { | Achaines à 20 stries. . . . .   | 3                            |
|   |   | Achaines à 40-43 côtes . . . . .  | 7                            |
| 3 | { | Péricline à tomentum blanchâtre . . . . .                               | <b>1624. C. pygmæa.</b>      |
|   |   | Péricline à poils noirâtres. . . . .                                    | 4                            |
| 4 | { | Péricline à folioles égales . . . . .                                   | <b>1627. C. foliosa.</b>     |
|   |   | Péricline à folioles externes plus courtes . . . . .                    | 5                            |
| 5 | { | Feuilles inférieures non lyrées. . . . .                                | 6                            |
|   |   | Feuilles inférieures lyrées. . . . .                                    | <b>1623. C. marginata.</b>   |
| 6 | { | Feuilles entières ou obscurément dentées. <b>1626. C. integrifolia.</b> |                              |
|   |   | Feuilles à lobes décombants. . . . .                                    | <b>1625. C. grandiflora.</b> |

\*\*\*\* *Achaines à 20 stries.*

— *Achaines plus courts que l'aigrette.*

a *Achaines fauves.*

**1623. *C. marginata* (*C. marginée*).** *C. lampanoides* Frœl. ; *Gr.*, *G.* — Feuil. caulinaires inf. lyrées, à lobe terminal en cœur ou tronqué, à pétiole amplexicaule. Fl. jaunes; corymbe dressé-subétalé.  $\frac{1}{2}$ . Jt-At.

Montagnes : Lhéris, Campan, Barèges (*Corb.*); Héas (*Miégl.*). CC.

b *Achaines orangés.*

**1624. *C. pygmaea* (*C. pygmée*) *L.*; *Gr.*, *G.* — Feuil. ovales-subcordiformes, dentées, à pétiole lyré-denté. Fl. jaunes, violacées en dessous; 1-3 calathides par tige.  $\frac{1}{2}$ . Jt-At.**

Montagnes : estibe de Luz, Gavarnie (*Corb.*); Marboré (*Ph.*). C.

— *Achaines aussi longs que l'aigrette.*

a *Achaines fauves.*

**1625. *C. grandiflora* (*C. grandiflore*) *Tausch*; *Gr.*, *G.* — Feuil. caulinaires dentées ou entières, sagittées-amplexicaules. Fl. jaunes; 2-5 calathides par tige.  $\frac{1}{2}$ . Jt-At.**

Montagnes : pic du Midi, Barèges (*Ph.*); environs du port de Pinède (*Corb.*). CCC.

b *Achaines jaunâtres.*

**1626. *C. integrifolia* (*C. intégrifollée*).** *Hieracium integrifolium* *Lois.*; *C. succisæfolia* *Tausch*; *Gr.*, *G.* — Feuil. caulinaires amplexicaules, l'inférieure contractée au-dessus de sa base, les autres lancéolées. Fl. jaunes; corymbe lâche.  $\frac{1}{2}$ . Jt-At.

Montagnes : estibe de Luz (*Gr.*; *G.*). RR.

≡ *Achaines plus longs que l'aigrette.*

**1627. *C. foliosa* (*C. feuillue*).** *C. blattarioides* *Vill.*; *Gr.*, *G.* — Feuil. caulinaires ovales ou lancéolées, acuminées, dentées, sagittées, amplexicaules par 2 oreilles aiguës-dentées. Fl. jaunes; calathides ordinairement 1, ou 3-6 en corymbe.  $\frac{1}{2}$ . Jn-Jt.

Montagnes : Campan, Barèges, Caunterets (*Corb.*). CC.