

trum breve sensim attenuata. Pappus pluriserialis pilosus albissimus. — Herba reg. Mediterraneæ incola perennis glabra. Radix tuberosa ovata. Caules basi flagelliformes sub terrâ fibroso-radicantes. Folia è collo orta ovali-oblonga utrinque acuminata integra aut subdentata. Scapi erecti apice summo cum involucri basi piloso-glandulosi aphylli simplices, rarissimè bifidi subfoliosi. Flores flavi.

1. *E. ZELOSIA* (Cass. l. c.). \mathcal{H} in arenis maritimis et etiam rariùs in rupium fissuris Galliarum australioris, Corsicæ, Italiæ, Siciliæ, Dalmatiæ, Istriæ, Archipelagi. Etiam ex Armorica misit cl. Bonnemaison. *Leontodon bulbosum* Linn. sp. 1132. *Hieracium bulbosum* Willd. sp. 3. p. 1562. *Crepis bulbosa* Fröel. in lit. *Prenanthes bulbosa* DC. fl. fr. n. 2883. *Taraxacum bulbosum* Reichenb. fl. exc. n. 1792. *Hieracium stoloniferum* Viv. fragm. 1. t. 20. — *Clus. hist.* 2. p. 145. f. 2. *Lob. icon.* t. 230. f. 2. (v. v. et s.)

DCCCXXVII. *CREPIS* *Macrob. mech.* 534. *DC. fl. fr. ed.* 3. v. 4. p. 38. *Less. syn.* 136. *Fröel. in lit.* 1837 (1). — *Crepis Phœcasium* et *Brachyderea* Cass. — *Crepidis* et *Hieraci* sp. *Linn. et succ.*

Capit. multiflorum. Invol. duplex, int. 1-seriale, ext. breve calyculiforme. Recept. epalesceum. Achania teretiuscula exalata sensim in rostrum breve attenuata. Pappus pilosus albus mollis multiserialis. — Herbæ pleræque Europæe annuæ aut biennes erectæ ramosæ. Folia sæpiùs pinnatifida, formâ in iisdem speciebus varia. Flores flavi. Invol. ferè Senecionis. — Genus naturalissimum cum ad hoc revocantur species omnes Hieraci auctorum pappo niveo donatæ. Cæterùm specierum limites et diagnoses difficillimæ et genus monographis commendatum.

Sect. I. *PHÆCASIUM* *Reichenb. fl. exc.* 1. p. 257. — *Phœcasium* *Cass. dict.* 39. p. 387.

Capit. pauciflorum. Invol. squamæ exteriores adpressæ.

1. *C. PULCHRA* (Linn. sp. 1134), caule erecto basi simplici apice laxè paniculato, foliis radicalibus runcinatis basi attenuatis, caulinis ovato-lanceolatis basi sagittatis dentatis integrisve, invol. cylindraceo, squamis exter. paucis acutis brevibus margine scariosis. \mathcal{H} in rudertis et collibus Galliarum ferè totius, Germaniæ, Italiæ, Tauriæ, Asiæ occid., etc. *Chondrilla pulchra* Lam. dict. 2. p. 77. *Prenanthes paniculata* Moench met. 534. *Lampsana pulchra* Vill. dauph. 3. p. 163. *Prenanthes hieracifolia* Willd. sp. 3. p. 1541. *Prenanthes pulchra* DC. fl. fr. ed. 3. n. 2882. *Phœcasium lampsanoides* Cass. dict. 39. p. 387. *Hieracium pulchrum* J. Benth. hist. 2. p. 1025. *Prenanthes viscosa* Baumg. — *Moria, ox.* 2. 7. t. 5. f. 13 et 37. Variat caule glabro aut pube parvâ scabro, foliis radical. runcinatis aut vix dentatis. (v. v. et s.)

β . *lampsanifolia*, paniculâ confertiore, pedunculis brevioribus magis erectis.

\mathcal{H} *Hierac. leptomacrosaulos* Col. oeph. t. 269. *Crepis pulchra* β Linn.

1. c. *Crepis lampsanifolia* Reichenb. fl. exc. 1. p. 257. (v. s.)

Sect. II. *BRACHYDEREA*. — *Brachyderea* *Cass. dict.* 48. p. 429.

Capit. multiflorum. Invol. squamæ externæ adpressæ. Recept. subimbriliferum.

2. *C. RIGIDA* (Willst. et Kit. pl. var. hung. 1. p. 18. t. 19), subcaudex, caule erecto rigido striato, foliis dentatis rigidis, radicalibus obovatis, caulinis sagit-

(1) Sectiones generis IV, V et VI, à cl. Frölich elaboratæ sunt et usâ cum Hieraciorum synonimâ communicatæ.

- (Reich.), in arvis et ruderalis Dahuricæ (Turcz.!) Sibiricæ (Gmel.) Hieracium, etc. Gmel. fl. sib. 2. p. 28. t. 11 nec 12. Crepis Gmelini Schultz fl. bav. Cr. agrestis Sadl. non W. et Kit. Crepis tectorum var. Ledeb. (v. s.)
18. *C. STYMONA* (Turcz. in litt. 1833), glaberrima, caule erecto simplicissimo, foliis lingulato-linearibus, inferioribus obtusis basi attenuatis denticularis, super. sessilibus integerrimis acutis, paniculâ racemosâ contractâ, capitulis circ. 9-floris cylindraceis, calyculi squamis parvis acutis. (2) in salsis Dahuricæ ad lacum Tarei et Mongolicæ Chinesicæ detexit cl. Turczaninow. Herba sesquipedalis. Fol. inf. 3 poll. longa, 3 lin. lata. Flores lutei. Pappus albidissimus. Achænia longit. striata. (v. s.)
19. *C. BUNGEI* (Ledeb. ex Turcz. in litt. 1833), tenuissimè arachnoidea seu glaberrimula, caule strictè erecto folioso simplicel, foliis oblongis integris acutis remotè dentatis utrinque acuminatis, corymbo 2-6-cephalo, pedicellis squamosis apice involucrique nigro-pilosis, invol. squamis acuminatis margine scariosis. (2) in insulis Kuralicis fl. Tschuja et ad fl. Lena Sibiricæ (Ledeb.), ad Balcalem, in paludosis humidis ad ostium Kischta Dahuricæ (Turcz.). Hieracium strictum Ledeb. fl. alt. 4. p. 132. excl. indic. icon. H. uliginosum Turcz. in litt. — Gmel. sib. 2. p. 30. n. 26. t. 13. f. 1. — *C. Bungeana* Mey. ex Bunge! in litt. est var. 1-cephala. (v. s.)
20. *C. ANDRYALOIDES* (Lowe! prim. fl. mad. p. 25), sparse hispida, caule erecto subfastoso superne laxè paniculato, foliis omnibus indivisis oblongis acuminatis remotè dentatis subsinuatis sessilibus, super. acutè auriculato-cordatis, capitulis remotis, pedicellis divaricatis, involucrique glanduloso-hirsutissimis. (2) in convallibus orae septentr. Madag. Achænia equidem vix matura erecta, an ex cl. Lowe demùm rostrata? Invol. squam. erecte persistentes. Radix carnea. (v. s. comm. à cl. inv.)

Sect. IV. INTYBELLIOIDES. — *Intybellia* Monn. nec Cass. — *Geracii* sp. *Reichenb.*

Invol. biserialè basi calyculatum. Achænia columnaria. Capitula cylindracea. Scapus subpolycephalus. — (Auct. cl. *Froelich.*)

21. *C. MAURITIANA* (Froel. in litt. 1837), scapis cespitosis aphyllis subdiciphalis, foliis lyratis glabris, pedunculis terminalibus involucrique glabris. (2) in insula Francicæ Hieracium Mauritianum Willd. herb. 14637! Folia lyrata, lobo terminali ovato sinuato denticulato, supra glabra, subter setulis minimis scaberrimula. Flores lutei minuti, illis Hier. paniculati minores, nobiles cernui. Invol. basi calyculatum 12-14 flosculis refertum. Gerumen angulatum scabrum. Structura involucri omninò eadem ac in sequentibus. (v. s. sp. comm. à cl. *Comers.*)
22. *C. GNEZINI* (Froel. in litt. 1837 non Schult.), scapo aphylo, foliis spatulato-lanceolatis sinuato-dentatis glabris, involucri cylindraceo pedunculorumque apice glanduloso-hispidulis. (2) in Sibiricâ ad Irkutiam et Ochotiam. Hieracium Gmelini Linn. sp. 1197. — Gmel. sib. 2. p. 23. t. 8. f. 2! bon. Scapus vix spatuliformis corymbo oligocephalo terminatus. Flores parvi Prenanth. Chondrell. magnitudine et formâ similis. (v. s. sp. in herb. Gærtneriano et Stuttgart. comm. à cl. Gmel.)
23. *C. PRÆMORSÆ* (Froel. in litt. 1837), scapo polycephalo racemoso folisque obovatis subcrenato-denticulatis molliter hirtis, involucri cylindraceo calyculato glaberrimulo, ligulis apice truncatis. (2) in herbicidis apricis montosis Europæ, Sibiricæ Hieracium præmorsum Linn. sp. 1196. Gmel. sib. 2. p. 32. t. 13. f. 2. opt. fl. dan. t. 942. Willd. herb. 14657! DC. fl. fr. 4. p. 18. Hier. lactucaceum Schrank. fide herb. Geracium præmorsum Moench et Reichenb. fl. 2. 1367! *Intybellia præmorsa* Monn. ess. p. 79. *Intybus præmorsus* Fries novit. ed. 2. p. 245. Hæc cl. Ledeb. adducit Gmel. fl. sib. 2. p. 32. n. 28. t. 13. f. 2. quod ad H. lactucaceum Gmel. syst. 1177 citatur. Flos luteus.
- β. *glabrata*, scapo folisque glabris. (v. s.)