

11. *Raillardia Fauriei* Lévl., nov. spec.

Affinis *R. montanae* Mann a quo distinguitur foliis ad basin ramorum floralium confertissimis, abietiformibus, 25×5 mm scabro-ciliatis, 7—9 nervatis, raro 1 ant 2 dentibus praeditis, capitulis 5—9, akoeniis apice hirsutis.

Hawaiï: Maunakea, jul. 1909 (U. Faurie, 1015).

12. *Cnicus hawaiensis* Lévl., nov. spec.

Caulis robustissimus, striatus, pilosus; folia lanceolata sinuata, amplexicaulia sed non decurrentia spinis flavidis ad margines et ad nervos munita 12×2 cm, flores ad apicem praesertim dense congesti; capitula maxima; inflorescentia foliosa; bracteae involucrales lineares valide armatae et in spinam robustissimam desinentes; flores tubo elongato 2 cm; pappus sordide albidus; akoenia oblongo-cylindrica levissima et glaberrima.

Hawaiï: Maunakea, 2000 m, jul. 1909 (U. Faurie, 963).

13. *Dubautia Fauriei* Lévl., nov. spec.

Affinis *D. laxae* Hook. a quo recedit foliis membranaceis, utrinque strigoso-hirtis, capitulis 4—5; involucri bracteis nervatis, glabratis, ciliolatis.

Maui: Wailuku, aug. 1909 (U. Faurie, 920).

14. *Crepis (Barkhausia) molokaiensis* Lévl., nov. spec.

Habitus et aspectus *C. virentis* sed bene distinctus: caulibus multis, ramosissimis, nudis, multifloris; floribus tamen ad apicem ramorum et caulium solitariis, akoenio in rostrum 5 mm ipsi aequilongum attenuato.

Molokai: Kamolo, 1000 m, juin 1910 (U. Faurie, 974, 976).

15. *Lipochaeta variolosa* Lévl., nov. spec.

L. calycosae Gray proxima a qua distinguitur foliis penninerviis, sinuatis, irregulariter dentatis, variolosis, ad basin conspicue asymmetricis, acuminatis; bracteis involucri externis acuminatis.

Molokai: Wailau; Kauai: Wainiha, jun. 1910 (U. Faurie, 1008, 1009).

16. *Lipochaeta asymetrica* Lévl., nov. spec.

Caulis 80 cm altus, costatus, rubescens, glaber; folia penninervia triangulari-ovata, ad basin conspicue asymetrica, dentata glabra eleganter venosa, media, petiolo 2—3 cm incluso, 8×3 cm; inflorescentia composite bracteato-cymosa; capitula solitaria vel bina; bracteae florales brunneae, lanceolatae margine anguste scariosae; flores ligulatae 4, ligulis striatis, apice bilobis et inter lobos mucronatis; flores tubulosi sat numerosi; akoenia quadrangulo-alata unde sulcata elongata, glaberrima et brunnea. — Nulli speciei *Sandwicensi* proxima.

Oahu: Kaliki, oct. 1909 (U. Faurie, 960).

17. *Lipochaeta Fauriei* Lévl., nov. spec.

Caulis costatus, scabridus, puberulus; folia scabrida ovata dentata inciso-lobulata petiolata e basi conspicue trinervia ad basin dilatato-cuneata; flores ad apicem ramorum dispositi, terni, foliis breviores; bracteae involucrales breviter sed dense hirsutae ad basin paulo gibbosae;