

*valdepilosum* Vill.; probablemente de la sección *Cerinthoidea* Fr. —Altura 20 centim., hojas lanceoladas, agudas, caulinas abrazadoras: cabezuelas solitarias: escamas, verde-oscuro, pelos negros en la base y el resto blancos: estilos amarillos.—Pasajes, *Lomax*: Julio 1892.

H. MYRIADENUM B. R.—*H. amplexicauli* × *Pilosella* Pau in litt.

No solamente tengo por especie híbrida esta forma, sino que el mismo *H. Vahlia* Fr. que desconozco, deberá serlo también. El señor Vicioso, no ha recogido en el Moncayo más especie de este género que el *H. amplexicaule*.

H. CASTELLANUM B. R.

Sierra de Albarracín (*Zapater*).—Como nuevo para la Flora de Aragón.

CREPIS HISPANICA Pau.

Hasta las mayores alturas de Jabalambre (2000<sup>m</sup>) Julio 1887: Camarena; Agosto, 1892: Monreal del Campo (*J. Benedicto*).—Habita también en los Alpes Marítimos!

C. BULBOSA Tsch.—*Aetheorhiza bulbosa* Cass.

Collados y orillas de los caminos, sitios pedregosos de los montes, Segorbe; Abril 1893, hasta 400<sup>m</sup> de alt.—También la he recogido en Puerto de Santa María.

C. ALBIDA Tsch. a) MAJOR Wk. forma INTEGRIFOLIA.—*C. scorzonerooides* Rouy.—*C. macrocephala* Nym.—*Barkausia macrocephala* Wk.

Esta forma de hojas dentadas, agudas ú obtusas, es frecuente desde Segorbe (24 de Junio 1889), Viver (1886) hasta Aragón: Rubielos de Mora, Olba, Torrijas (Julio 1895).

C. ERYTHIA Pau, pl. de la Bética.—*C. scariosa* Wk.—*C. vesicaria* b) *Willkommii* Per. Lar.?

Arenales marítimos de Puerto de Santa María (Cádiz). 18 de

Abril de 1895.—Como todavía no ha sido publicada en los *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, ó al menos repartido el cuaderno segundo, no puedo indicar la página en que está propuesta por primera vez.

C. MONREALENSE Benedicto et Pau.

Afine de la *C. Hyemalis* Ces. de la cual difiere por sus pedúnculos alampañados, botones de las cabezuelas oblongos, escamas exteriores lampiñas. No conozco la variedad de esta especie (*C. Hackeli* Lge.): pero ateniéndome á la descripción, difiere por las cabezuelas de la figura dicha, hojas radicales trasovadas, escamas interiores del antodio negro-cerdosas en el dorso y estilos negros.

Común en las huertas de Monreal del Campo, Octubre y Noviembre de 1894 (*Benedicto*).

PICRIDIUM CRASSIFOLIUM Willk.

Ribazos de las cercanías de Segorbe, y entre Sigunto y Almenara, antes de llegar á Chilches.—Hábito de *Microrhynchus nudicaulis* Less.

TOLPIS BARBATA G.—*Hieracium medio nigrum, bæticum minus* Cluss.

Sierra de Espadán (28.v-1895) rara.

T. BÆTICA Pau, pl. de la Bet.—*T. barbata* b) *grandiflora* J. Ball.—*Hieracium medio nigrum, bæticum, majus* Cluss.

Collados entre Dos Hermanas y Sevilla. 21 de Abril de 1895.—Tengo á esta forma como especie buena é independiente: y no comprendo, como esta planta tan particular no ha sido admitida como autónoma, siendo así que se admiten como diferentes las *T. barbata* y *T. umbellata* tan afines y tan difíciles de distinguir, y por los mismos autores que nos dan la *T. bætica*, como variedad de la *T. barbata*.

CAMPANULA DICHOTOMA L.

Jabalambre, en la bajada de *Mancho* á *Los Olmos* á unos 1400m