

743. *H. collinum*. *D. C. Fl. fr. Sup. n.* 2915. (a)
H. cymosum. *Wild. Sp. 3. p.* 1566. *H. auricula*. *Var. b.*
Marsch. Fl. taur. Sup. n. 1607. — In collibus gramino-
 sis, circa Trapezum. Junio florens. π

744. *H. foliosum*. *Wild. Sp. 3. p.* 1589. *Marsch.*
Fl. taur. n. 1614. — Passim in lazaret Odessæ. Florens
 julio. π

745. **CREPIS** *nemausensis*. *Wild. Sp. 3. p.* 1592.
Sibth. n. 1615. *Hieracium sanctum*. *Sp. pl.* 1127. —
 In herbidis Tauriæ, circa Theodosiam haud rarè. \circ

746. *C. montana*. Caule erecto basi folioso supernè
 ferè nudo multifloro, foliis radicalibus longissimis pin-
 natifidis, lobis ovatis latis integris, extimo subcordato
 apice rotundato, floribus magnis paucis, squamis caly-
 cinis pubescentibus margine membranaceis.

Affinis præcedenti, satis tamen differt radice perenni,
 foliis radicalibus amplis pinnatifidis, floribus quadruplò
 majoribus. — Frequens in montibus insulæ Coi. Maio flo-
 ret. π

747. *C. hispida*. *Wild. Sp. 3. p.* 1601. *Marsch.*
Fl. taur. n. 1624. *Barckausia setosa*. *D. C. Fl. fr.*
n. 2951. — In pascuis Odessæ haud rara. Floret maio. δ

748. *C. vesicaria*. *Sp. pl.* 1132. (a) *Wild. Sp. 3.*
p. 1594. *Sibth. n.* 1928.

Hieracium Creticum, endiviæ-folio. *Tourn. Cor.* 35.
Gundelsheimer in Herb. Tourn.

Circa Byzantium ad sepes copiosè. Maio floret. π

749. *C. angusti-folia*. Caule erecto scabro sulcato su-
 pernè ramoso, foliis inferioribus sinuatis seu pinnatifidis,
 caulinis amplexicaulibus longè et acutè sagittatis dentatis
 angustissimis, summis linearibus integris, floribus nu-