

- γ. *multiflora*, racemō subcomposito elongato. (v. s. sp. ex subalpinis Algov.)
 δ. *lanceolata*, foliis lanceolatis acutis.
 ε. *grandiflora*, floribus duplō majoribus, herbā robustiore. (v. s. sp. ex Helvetiā.)
 ζ. *petiolata*, foliis radic. longiūs petiolatis. (v. s. sp.)
24. **C. MULTICAULIS** (Ledeb. fl. alt. 4. p. 125. icon. 1. t. 36), scapis 1-3 è collo erectis apice ramoso-corymbosis, pedicellis involucrique glanduloso-pilosis, foliis radicalibus oblongis petiolatis lyrato-pinnatifidis, invol. cylindraceo squamis ext. 4-5 lanceolato-linearibus adpressis. 2ℓ in lapidosis insularum fl. Tschuja ad ostium fl. Kurai Sibiriae Altaicae (Ledeb.). Folia ex Ledeb. utrinque pilosa. Pappus achænio brevior. Ex icone proximè ex Frœl. accedit ad *C. præmorsam*.
 β. *Ochotensis* (DC. herb.), foliis glabriusculis dentatis, scapis pube subaraneosâ infrâ pube glandulosâ parcè vestitis. 2ℓ in Sibiria Ochotensi inter Aldan et Ochotzk legit cl. Turczaninow. Pappus achænio æqualis aut longior. (v. s.)
25. **C. INCARNATA** (Less. syn. 137. excl. syn. ex Frœl. in litt. non Vis.), scapo polyccephalo paniculato, foliis oblongo-obovatis crenato-denticulatis molliter hirtis, involucri cylindraceis calyculatis glabris, ligulis apice retusis (subtibus). 2ℓ in montosis subalpinis Carinthiae! Carnioliae! H. incarnatum Wulf. in Jacq. coll. 2. p. 127. Jacq. ic. rar. t. 578! Sturm flor. 39. opt.! Willd. herb. 14656! H. montanum Scop. carn. 2. p. 106. t. 50. Geracium incarnatum Reichenb. Ligulæ apice retusæ incarnatæ et inflorescentia paniculata, quibus notis à sequenti potissimum differt. (v. s. sp. comm. à cl. Wulfen.)
26. **C. FROELICHIANA** (DC. herb.), scapo oligocephalo corymboso, foliis oblongo-obovatis subtus molliter hirtis, involucri cylindraceo calyculato glabro, florum ligulis apice truncatis (flavis). 2ℓ in Alpibus Tyrolis australis in glareosis herbis convallibus Duron et Lusiam!, in valle Susanâ Helvetiae!, agro Veronensi! H. parviflorum Schleich. ex sicc.! Gaud. fl. helv. 5. p. 123. Geracium parviflorum Moesl. et Reichenb. 2. p. 1367. Hieracium auriculæfolium Willd. herb. n. 14657. Crepis auriculæfolia Frœl. in litt. non Sieb. Media inter H. præmorsam et incarnatam, at florum color constantissimus. (v. v. s.)
 β. *subglabra*, foliis glabriusculis. (v. v. in valle Lusiam.)
 γ. *pauciflora*, scapo humili sub-2-cephalo. (v. v. ibidem.)
27. **C. OPORINOIDES** (Boiss. ined.), glabra, caule ramoso subaphyllo, foliis radicalibus elongatis pinnatifidis, lobis lanceolatis mucronulatis subintegris, caulinis paucis linearibus, invol. calyculato subfarinoso-puberulo, squamis calyculi ferè subulatis. 2ℓ? (2)? in Hispaniæ Granatensis Sierra Nevada legit cl. E. Boissier! qui speciem valdè variantem observavit. In rupibus apricis ad radices montium caules erecti ramosiores, folia angustiora acuta magis laciniata. In lapidosis et excelsioribus scapi decumbentes, folia obtusiora et infernè tantum incisa aut dentata. Oporiniæ habitum, præsertim var. ramosior, exhibet. (DC. v. s. comm. à cl. inv.)

Sect. v. **HAPALOSTEPHIUM** Don. — *Catonia* Cass. — *Soyeria* Monn. *ess. Hierac.*

Invol. ovatum multiseriale squamis aliquot exterioribus elongatis laxis obvallatum. Achænia fusiformia elongata. — (Auct. cl. Frœlich.)

28. **C. CHRYSANTHA** (Frœl. in litt. 1837), glabra, scapo sub-1-cephalo subuni-folio supernè involucri ovato obvallato laxiusculo hirsuto, foliis oblongo-spathulatis basi attenuatis sinuato-denticulatis longè petiolatis, caulino sessili lanceolato. 2ℓ in montibus Altaicis circa Ridderfk. Hieracium chrysanthum. Ledeb. fl. alt. 4. p. 129. ic. ill. flor. ross. t. 456. H. frigidum Steven in litt. ad Zeyher. Maximè affinis *C. alpestris*. Scapus semipidem longus, suprâ medium