

Cal. ovatus, squamis ambitu tomento albican-
tibus. Sem. oblonga, subincurva.

staticifolium. H. caule ramofo: fol. radicalibus linearibus, sub-
denticulat. caulinis minimis. *All. Misc. Taur.*
Tom. V. Fl. Ped. tab. 81. f. 2. Vill. prosp.
tab. XIII. f. 1.

In sabulosis aridis secus flumina, & in rupium
fissuris, locis calidioribus ¶.

Fol. fere linearia, remote, & obiter denticula-
ta, concava, numquam pilosa. Rami, & pe-
dunc. fatis squamosi. Cal. ad basin calyculat.
squamis parvis, fere capillaribus.

In locis aridis adnata, evadit farinosa.

succisaefolium. H. fol. integerr. lævibus: radicalibus longe pe-
tiolatis, ellipticis; caulinis amplexicaulibus;
hamis obtusis. *Hall. helv. n. 47. All. Fl. Ped.*

In Helvetia, & Pedemontio ¶.

Caulis brachiatus, pauciflorus. Fol. glaberrima,
venosa; ima longissime petiolata, inde longe
ovata, obtusa, vix aliquo dentium vestigio
relictis; superiora amplexicaul. hamis brevibus,
& obtusissimis; summa linearia. Cal. niger,
hirsutus.

grandiflorum. H. fol. lanceolatis, ferratis, hirsutis: calyc. vil-
lofis. *Hall. helv. n. 40. All. Fl. Ped. tab. 29.*
f. 2. 3. Vill. prosp. tab. 10. f. 2.

In alpium pratis ¶.

Caul. crassus, profunde sulcatus, ramosus, bra-
chiatus, ramis 1-fl. Fol. semiamplexicaul. lon-
gis dentibus auriculata; ramea lanceol. Pe-
dunc. subnudi. Cal. squamis concavis, carina-
tis; squamulis ad basin minoribus. Planta tota
villosa, aspera. *Var. humilior, & viscosa.*

spicatum. H. caule multifloro: fol. amplexicaulibus, rariter
dentatis, pilosis. *Hall. helv. p. 43. All. Fl.*
Ped. tab. 27. f. 1. 3. Vill. prosp. tab. 9. f. 2.
& tab. 10. f. 1.

In sylvis montanis ¶.

Tota planta brevibus pilis hirsuta. Fol. ovato-
lanc. supra obscure virentia, exsiccata nigra
evadunt; caulina subintegra. Rami axillar. flo-
riferi. Cal. subcylindric. nigris pilis barbatus.

1092. CREPIS. Cal. calycular. squamis deciduis. Receptacul.
nudum. Pappus plumosus, stipitatus, aut
simplex.

Rad. multicaul. Caul. subpedal. ramosi, teretes, glabri. Fol. ima sinuato-dent. villosula; summa integerr. Cal. exter. squamis adpressis, nec patulis: interior glaber, divergens. Semisflosc. multi, flavi.

radicata. C. fol. sinuatis, dentatis, ciliatis, radicalibus: caulibus prostratis, multifl. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Caul. femispitham. ramosi, angulati, hispidi. Fol. 3-pollic. sessilia, extrorsum latiora. Bract. ad ramorum exortum hastato-lanceol. hispida. Cal. fetis nigris adpersus. Cor. flava.

(*muricata.*) C. calycibus muricatis. *Hall. hist. n. 32.*

In Helvetia.

Caul. cubit. brachiatus, angulosus, glaber. Fol. subhirsuta, ex petiolo in ovalem bracteam dilatantur obtusam, modice ferratam: caulina etiam petiolat. lanceol. prope petiolum acute, & profunde dentata; superiora semiamplexicaul. Flos parvus, flavus.

(*hamata.*) C. fol. ad terram pinnatis; superne amplexicaulibus, pinnatis, hastatis. *Hall. hist. n. 31.*

In Helvetia.

Planta polymorpha: alias e radice brachiata; alias recto caule ab imo ad summum ramoso. Caul. 4-pedal. angulosus, glaber, plerumq. brachiatus, & ramosus, inferne hirsutus, superne lævis. Fol. variabilia, ad terram *Taraxacum* aliquantulum imitantur laciniarum numero, & profunditate. Caulina amplexicaul. etiam hamata, longa, hastata, vel angusta, ant semipinn: vel simplicia, dentata, aut integerr. Cal. albo polline adpersus.

Var. fol. linearibus, aut elliptico-lanceolat. integerrimis: imis latioribus; superioribus angustioribus. Habitus Campanul. vulg. rotundifolia.

albida. C. fol. (plerumq.) runcinato-dentatis, incanis: squamis calyc. membranaceis: flore albedo. *Vill. prosp. tab. 12. f. 1. All. Fl. Ped. tab. 32. f. 3.*

In locis saxosis montanis, apricis 24.

Caul. pl. 2-3-choromi; ad ramorum divisiones folium sessile. Fol. radicalia elliptica, lente in petiolum foliosam adtenuata; crassula, raro integerr. caulina semiamplexicaul. asperiora,