

Pag.

844. post **C. glabram** insere :

C. Murmanni, pallide virens tota setulis flexuosis mollibus viscidulis obsita, radice præmorsâ, foliis radicalibus longiuscule petiolatis elongatis lyratis, segmento terminali magno ovato-subcordato grosse crenato dentato obtuso, lateralibus utrinque 2-3 parvis dissitis triangularibus acutis secus costam anguste decurrentibus, caule elato crassiusculo striato composite corymboso subumbellato polycephalo, foliis caulinis late auriculato-amplexicaulibus acutius dentatis summis attenuato-acuminatis, bracteis ad umbellarum basin 1-2 parvis setaceis, capitulis mediocribus, calyculi phyllis 5-6 triangularibus acutis involucri quadruplo brevioribus, involucri nigricantis minute puberuli phyllis linearibus acuminatis, ligulis luteis elongatis, acheniis striatis apice vix attenuatis pappo æquilongis 2.

Hab. in collibus calcareis ad Flemur prope Byzantium (Murmman!). Fl. Maio.

Sesquipedalis, folia 6-8 poll. longa segmento superiore bipollicari. Valde affinis *C. lampsanoidi* a quâ differt foliis caulinis abrupte caudato-acuminatis, corymbo polycephalo composite umbellato, capitulis minoribus.

845. **C. Sieberi** β . *Mungieri*, adde :

Hab. in faucibus umbrosis montis Lastos insulæ Karpathos (Pichler!).

846. **C. Reuteriana**, adde :

Hab. in Bithyniâ prope Broussa (Pichl.!) et in dumetis Troadis ad Renköi (Sint.!).

849. **C. parviflora**, adde :

Hab. in fruticetis Cypri ad Prodromo N° 808! et prope Kalorgha (Sint. et Rigo N° 283!), in Ægypto ad Kahiram (Sickenb.!), in ditone Fayoum (Schweinf.!), in Oasibus parvâ et magnâ (Aschers.!).

849. **C. Cretica**, adde :

Hab. in aridis Malaxa Cretæ (Reverch.!).

852. **C. Kotschyana**, adde :

Hab. in Assyriæ deserto inter fluvium Chaboras et montem Sindjar sito (Haussk.!).

852. **C. senecioides**, adde : ex cl. Aschers. in litt. hûc nec ad *Picridem radicatam* referenda est *Crepis radicata* Forsk. Pl. Æg. p. 145 non Sibth.