

282. *O. uralensis*: *Decand. Astr.* p. 69. *Astr. uralensis*, *Hort. Kew.* iv. p. 870.
Phaca sordida: *Wahl. Fl. Lapp.* p. 190. (A.)

283. *Astragalus melaniocarpus*: *Frazer's Catalogue.* A. *Missouriensis*: *Nuttall*,
 ii. p. 99? *exclus. syn. Purshii.* A. *Setosus*: *Pursh inced. Herb. Lamb.* (C.)

284. *A. vaginatus*: *Pall. Astr.* p. 76, t. 36. (B.)

285. *A. aboriginorum*: suffruticosus erectus canescens, foliis sessilibus, foliolis
 6-jugis lanceolato-linearibus, racemis axillaribus laxis foliis longioribus. (C.)

Præcedenti similis. Radix teres longa flavescens Glycirrhizæ similis è quo surgunt caules plures pedales
 suffruticosi erecti graciles simpliciusculi pilis mollibus canescentes. *Folia* sessilia pinnata, pube canescenti
 ut in caule sed longiori et densiori: rachide bipollicari filiformi; foliolis plerumque 11, pollicaribus, sessilibus,
 linearibus lanceolatisve obtusiusculis basi attenuatis utrinque concoloribus nunc alternis nunc oppositis
 rariusve verticillatis; stipulis caulinis: inferioribus connatis ovatis acutis; superioribus magis distinctis acu-
 minatis. *Pedunculi* axillares foliis duplo longiores pilosi. *Racemus* erectus laxis 15-20 florus, pedicellis
 erectis calyce et bractea subulata pilosa brevioribus. *Calyx* nigrescenti-pilosus, laciniis quinque subulatis
 æqualibus: superioribus sinu obtuso separatis. *Corolla* albida cærulescensve carinâ eminente cæruleâ. *Vex-
 illum* ungue lato horizontali calyce breviori, limbo obcordato erecto. *Alæ* vexillo breviores carinâ paulo lon-
 giores, ungue tenui lineari, limbo oblongo emarginato ad basin lobo lineari obovato aucto. *Carina* obtusa
 calyce tertia parte longior. *Legumen* immaturum oblongum, pilis canis adpressis tectum, pedicello longitudine
 calycis sustentatum, stylo brevi incurvo capitato terminatum. *Semina* 14.

The Crees and Stone Indians gather its roots in the spring, as an article of food.

286. *A. hypoglottis*: *Willd.* iii. p. 1285. *Nutt. Am.* ii. p. 99. (S.)

287. *A. succulentus*: caulescens decumbens glabriusculus, foliolis ovalibus obtu-
 sis, stipulis glabris triangularibus, spicis pedunculatis folio brevioribus. (C.)

Herbaceus spithameus glabriusculus vel pilis adpressis vix conspicuis deciduis munitus. *Caulis* decumbens
 sub-angulatus superne crassior. *Folia* sessilia rachide bi-pollicari sub-trilaterali superne attenuata, foliolis
 21 trilinearibus, ovalibus obtusissimis aveniis brevissime ciliatis supra glabra subtus pilis sparsis inconspicuis
 munitis; foliolis exterioribus paulo minoribus; *stipulis* caulinis triangularibus integerrimis glabris viridibus,
 basibus infra petiolum connatis ibique costis tribus decurrentibus munitis. *Folia* basin versus caulis breviora
 foliolisque minora. *Pedunculi* foliis breviores, axillares, crassi. *Spica* sub-decemflora conferta. *Flores*
 magni ochroleuci, carinæ apice purpurascenti, bracteis membranaceis suffulti. *Calyx* subsessilis cylindricus
 membranaceus pallescens, inferne glaber, superne pilis sparsis munitus, dentibus subulatis sinus obtusis
 separatis. *Vexillum* alis quarta parte longius, oblongum, acute emarginatum, lateribus replicatis. *Alæ* carina
 tertia parte, calyce duplo longiores, ungue tenui, limbo lineari-oblongo integerrimo obtuso inferne lobo brevi
 obtuso aucto. *Germina* glabra, polysperma, stylo longo ad apicem incurvo acuminata. *Fructum* maturum
 non vidi.

SYNGENESIA.

288. *Leontodon palustre*: *Smith. Fl. Brit.* ii. p. 823. *Eng. Bot.* t. 553. (W. B.)

289. *Troximon glaucum*: *Pursh.* ii. p. 505. (S.)

290. *Hieracium prenanthoides*: *Willd.* iii. p. 1590. *Nuttall. Gen. Am. Pl.* ii.
 p. 125. *exclud. syn. Purshii.* (B.)

291. *Crepis? nana*: glaberrima, foliis ovatis integerrimis, pappo sessili. (B.)

Herba glauca sesquipedalis multiflorus. *Radix* fusiformis simplex caules plures brevissimos decumbentes alens. *Folia* radicalia confertissima ovata integerrima trinervia glaberrima supra olivaceo-viridia, subtus rubescenti-viridia, petiolis caules pedunculosque superantibus. *Caules* reliquis foliorum obtekti in pedunculos vel ramos corymbosos unifloros foliis paucis linearibus munitos divisi. *Calyx* gracilis cylindricus calycifolatus pedunculo vel ramo suo longior; squamis exterioribus brevibus linearibus adpressis diversae altitudinis: interioribus aequalibus carinatis glaberrimis. *Flosculi* saturate flavi calyce altiores lineares 5-dentati. *Semina* linearia supernè paulo attenuata pappo sessili simplice scabriusculo coronata.

Hab. On the Copper-Mine River.

292. *Saussuria multiflora*? *Decand. An. du Mus.* tom. xvi. p. 199? exclud. *synon.* Lin. (B.)

293. *Sonchus sibiricus*: *Willd.* iii. p. 1522. (W.)

294. *Tanacetum pauciflorum*: foliis bi-pinnatis villosis sessilibus, caule simplici foliis longiore subunifloro, flosculis omnibus hermaphroditis. *MS. in Herb. Banks.* (S.)
Ulnaris. Folia bi-pinnata et tripinnatifida, laciniis angustis obtusiusculis. Flos plerumque unicus terminalis interdum alter è suprema axilla.

295. *Artemisia virgata*: frutescens sericeo-incana, ramis erectis gracilibus, foliis capillaceis bi-pinnatifidis: floralibus simplicibus calyce hemispherico villosio longioribus. (W.)

Odor Art. Abrotani cui habitu similis sed foliis duplo minoribus.

296. *A. campestris*: *Willd.* iii. p. 1827. *Pursh.* ii. p. 521. (W.)

297. *A. borealis*: *Willd.* iii. p. 1839. *Pall. itin.* iii. p. 755. t. H. h. f. 2.

A. spithamea? *Pursh.* ii. p. 522? (B.)

298. *A. vulgaris*: *Willd.* iii. p. 1845. *Pursh.* ii. p. 522. (B.)

299. *A. integrifolia*: *Willd.* iii. p. 1846. *Gmel. Sibir.* t. 48. f. 1. *Pursh.* ii. p. 521. (W.)

300. *Gnaphalium plantagineum*: *Pursh.* ii. p. 525. *G. plantaginifolium*: *Willd.* iii. p. 1882. (W.)

301. *G. dioicum*: *Willd.* iii. p. 1882. (W.)

302. *G. alpinum*: *Willd.* iii. p. 1883. *Pursh.* ii. p. 524. (B.)

303. *Erigeron pulchellum*: *Mich. Am.* ii. p. 224. *E. bellidifolium*: *Pursh.* ii. p. 532. *E. serpentaria*: *Herb. Banks. MSS.* (S.)

304. *E. purpureum*: *Willd.* iii. p. 1958. *Pursh.* ii. p. 533. (S.)

305. *E. philadelphicum*: *Willd.* iii. p. 1957. *Pursh.* ii. p. 533. (W.)

306. *E. glabellum*: *Nuttall. Am.* ii. p. 147. (W.)

307. *E. uniflorum*: *Willd.* iii. p. 1960. *Eng. Bot.* t. 2416. (A.)

308. *Senecio pauciflorus*: *Pursh.* ii. p. 529. (S.)

309. *S. gracilis*: *Pursh.* ii. p. 529. (W.)

310. *S. balsamitæ*: *Willd.* iii. p. 1998. *Pursh.* ii. p. 530. (W.)

311. *S. aureus*: *Willd.* iii. p. 1998. *Pursh.* ii. p. 530. (W.)

312. *S. lugens*: tomentosus, foliis integris glanduloso-dentatis: radicalibus sub-spatulatis: caulinis linearibus acutis, caule simplici, corymbo denso. (B.)