

*S. oleraceus* (L.) Gou. — Beg. 223. — A: Prinkipo (Beg.); Antigoni (W 394).

*S. tenuerrimus* L. — Azn. BSBF 44: 173. — Degen 45: 68, — E, A. (Azn.). — Symplegiaden (Degen).

*Lactuca cretica* Desf. — Azn. BSBF 44: 173. — A.

*L. Serriola* L. — Azn. MBL 12: 174 (als *L. scariola* L. typ. und f. *integrifolia* Bogenh.) — A: Kurbal-Dere (Azn.).

*Crepis Murmanni* Boiss. — Azn. MBL 3: 8. — E: Flamur; Jeni-Köj (beide Azn.).

*Crepis Nemetzii* Rech. fil., sp. n.

Perennis ?. Caulis simplex, erectus, monocephalus, subtiliter sulcatus, valde glabrescens, 4—6 foliatus. Folia rosularia ad 10 cm longa, ad 2.5 cm lata, ambitu obovato-oblonga, apice rotundata, basi in petiolum lamina dimidio circiter breviorem sensim attenuata, runcinato-ovata lobis obtusiusculis, minute et remote cartilagineo-mucronulatis, consistentia in sicco papyracea (an in vivo carnosa ?) supra et subtus pilis sparsis 0.3—0.7 mm longis in sicco flavescentibus obsita. Folia caulinis sensim decrescentia, infima acuta runcinato-lobata, media subintegra apicem versus sensim angustata, summa integerrima, linear-lanceoleta, acutissima, subsquamiformia. Capitulum floribus inclusis ca. 4 cm diametro. Involucrum 15 mm longum eglandulosum 2 — (vel indistincte 3 —) seriatum, imbricatum; squamae exteriores ca. 10 mm longae acutissimae, e basi ca. 2 mm lata sensim agustatae, olivaceae, anguste membranaceo-marginatae, dorso villis flavescentibus saepe ultra 1 mm longis obsitae. Squamae interiores ad 15 mm longae, latiores, pallidiores, in medio dorso densius villosi, preterea utrinque pube minutissima nitidula obsitae. Ligulae in sicco sordide flavescentes. Achaenia (immatura) 2—3 mm longa, atro-brunea, erosa, non alata, obsolete sulcata. Pappus niveus ± 12 mm longus.

Kilia, Dünen, blühend am 9. Mai 1896.

Unterirdische Teile und reife Früchte fehlen, daher bleibt die systematische Stellung der Art vorläufig zweifelhaft. Es dürfte sich jedoch um eine Art mit Rhizom handeln. Habituell ist die Pflanze am ehesten mit einköpfigen, kräftigen Individuen von *Crepis alpestris* (Jacq.) Tausch zu vergleichen. Die Blattform erinnert etwas an *Crepis Fraasii* Schultz, nur daß der Endlappen viel weniger vergrößert ist als bei dieser. — Prof. Bornmüller teilt meine Ansicht, daß hier eine neue Art vorliegt.

*C. parviflora* Desf. — Azn. BSBF 44: 173. — A:

*C. pulchra* L. — Azn. BSBF 44: 173. — E.

*C. Reuteriana* Boiss. — A: Fuß des Bithynischen Olymp, Gebüsch bei Ak-Dschellan.

*C. setosa* Hall. — Azn. MBL 12: 174 (als *C. virens* L.). — E: Böyük-Dere (Azn.).

*C. vesicaria* L. var. *scariosa* (Willd.) Vis. — E: Domus-Dere.