

- γ. multiflora*, racemo subcomposito elongato. (v. s. sp. ex subalpinis Algov.)
δ. lanceolata, foliis lanceolatis acutis.
ε. grandiflora, floribus duplò majoribus, herbâ robustiore. (v. s. sp. ex Helvetiâ.)
ξ. petiolata, foliis radie. longius petiolatis. (v. s. sp.)*
24. *C. MULTICAULIS* (Ledeb. fl. alt. 4. p. 125. icon. 1. t. 36), scapis 1-3 è collo erectis apice ramoso-corymbosis, pedicellis involucrisque glanduloso-pilosis, foliis radicalibus oblongis petiolatis lyrato-pinnatifidis, invol. cylindraceo squamis ext. 4-5 lanceolato-linearibus adpressis. ♀ in lapidosis insularum fl. Tschuja ad ostium fl. Kurai Sibiriae Altaicae (Ledeb.). Folia ex Ledeb. utrinque pilosa, Pappus achænio brevior. Ex iconе proximè ex Frœl. accedit ad *C. præmorsam*.
β. Ochotensis (DC. herb.), foliis glabriusculis dentatis, scapis pube subaraneosâ infrà pube glandulosâ parcè vestitis. ♀ in Sibiria Ochotensi inter Aldan et Ochotzk legit cl. Turczaninow. Pappus achænio æqualis aut longior. (v. s.)
25. *C. INCARNATA* (Less. syn. 137. exc. syn. ex Frœl. in litt. non Vis.), scapo polycephalo paniculato, foliis oblongo-obovatis crenato-denticulatis molliter hirtis, involucro cylindraceo calyculatis glabris, ligulis apice retusis (inbentibus). ♀ in montosis subalpinis Carinthia! Carnioliae! H. incarnatum Wulf. in Jacq. coll. 2. p. 127. Jacq. ic. rar. t. 578! Sturm flor. 39. opt. Willd. herb. 14656! H. montanum Scop. carn. 2. p. 106. t. 50. Geracium incarnatum Reichenb. Ligulae apice retusae incarnatae et inflorescentia paniculata, quibus notis à sequenti potissimum differt. (v. s. sp. comm. à cl. Wulff.)
26. *C. FROELICHTANA* (DC. herb.), scapo oligocephalo corymboso, foliis oblongo-obovatis sahitùs molliter hirtis, involucro cylindraceo calyculato glabro, florum ligulis apice truncatis (flavis). ♀ in Alpibus Tyrolis australis in glareosis hérbitis convallibus Duron et Lusia!, in valle Susanâ Helvetiæ!, agro Veronensi! H. parviflorum Schleich. ex sicc. Gaud. fl. helv. 5. p. 123. Geracium parviflorum Moesl. et Reichenb. 2. p. 1367. Hieracium auriculæfolium Willd. herb. n. 14657. Crepis auriculæfolia Frœl. in litt. non Sieb. Media inter H. præmorsam et incarnatam, at florum color constantissimus. (v. v. s.)
β. subglabra, foliis glabriusculis. (v. v. in valle Lusia.)
γ. pauciflora, scapo humili sub-2-cephalo. (v. v. ibidem.)
27. *C. OPORINOIDES* (Boiss. ined.), glabra, caule ramoso subaphyllo, foliis radicalibus elongatis pinnatifidis, lobis lanceolatis mucronulatis subintegris, caulinis pauci linearibus, invol. calyculato subfarinoso-puberulo, squamis calyculi ferè subulatis. ♀? (2)? in Hispaniae Granatensis Sierra Nevada legit cl. E. Boissier! qui speciem valde variantem observavit. In rapibus apricis ad radices montium caules erecti ramosiores, folia angustiora acuta magis lacinata. In lapidosis et excelsioribus scapi decumbentes, folia obtusiora et inferne tantum incisa aut dentata. Oporinia habitum, præsertim var. ramosior, exhibet. (DC. v. s. comm. à cl. inv.)

Sect. v. *HAPALOSTEPHİUM* Don. — *Catonia* Cass. — *Soyeria* Monn. ess. *Hierac.*

Invol. ovatum multiseriale squamis aliquot exterioribus elongatis laxis obvalatum. Achænia fusiformia elongata. — (Anct. cl. Frœlich.)

28. *C. CHRYSANTHA* (Frœl. in litt. 1837), glabra, scapo sub-1-cephalo subunifolio supernè involucroque ovato obvallato laxiusculo hirsuto, foliis oblongo-spathulatis basi attenuatis sinuato-denticulatis longè petiolatis, caulinò sessili lanceolato. ♀ in montibus Altaicis circè Ridderfk. Hieracium chrysanthum. Ledeb. fl. alt. 4. p. 129. ic. ill. flor. ross. t. 456. H. frigidum Steven in litt. ad Zeyher. Maximè affinis *C. alpestri*. Seapus semipedem longus, suprà medium