

Haec forma (nonne species distincta ?) differt a *S. alternifolia* foliis basi non vaginantibus, foveolis distantibus aliisque notis.

Lecta in montibus Alatau, Iulio m.

SYNANTHERAE.

CREPIS OREADES SCHRENK.

C. (Eucrepis) perennis; scapis subaphyllis simplicibus v. ramosis, ramis patentibus; foliis villosiusculis, radicalibus petiolatis subintegerrimis, caulinis sessilibus; periclinii squamis tomentosis setosisque, exterioribus abbreviatis subadpressis; clinanthio glabro; nucleo longitudine achaenii.

A *C. Jacquini* Tsch. (*C. chondrilloide* Fröl., DC.), cui forsitan proxima, distinguitur herba plus minus canescente, scapis infra ramos aphyllis, foliis caulinis (si adsunt) paucis sessilibus aliisque notis; — a *C. Turczaninowii* C. A. Mey. (*Hierac. croceo* Turcz., non Lam.) nostra differt foliis radicalibus in petiolum nudum attenuatis, ramis brevibus patentibus, nec non clinanthio glabro (in illa setoso); — a *C. sonchifolia* C. A. Mey. (*Hieracio* M. B.) distat scapis infra ramos nudis, ramis haud elongatis, pericliniis hirtis etc.; — a *C. alpestri* Tsch. facillime distinguitur, praeter alias notas, achaeniis non supra nucleum in rostrum attenuatis; — a *C. chrysantha*

Fröl. et *C. polytricha* *C. A. Mey.* (*Hieracio Ledeb.*)
magis distat.

α *cinerascens*: scapo simplici v. ramoso; -foliis
plerisque runcinato-pinnatifidis canescentibus.

Radix descendens, cylindracea, nigricans, multicaulis. Scapi 2—5 poll. alti, erecti v. assurgentes, simplices v. ramosi, 1—4—cephali; rami patentes, haud elongati. Folia radicalia villo crispato plus minus canescentia, in petiolum nudum attenuata, plerumque runcinata v. pinnatifida; lobis triangularibus, lineari-lanceolatis v. linearibus, acutis, patentibus, integerrimis v. subdentatis; rarius dentata, subintegerrima; folia caulina in speciminibus simplicibus nulla vel linearia parva, in speciminibus ramosis solum ad ramorum basin, sessilia, radicalibus similia, runcinata v. integra. Calathidia magnitudine et forma similia calathidiis *C. Jacquini*; squamae lineari-lanceolatae, acutiusculae, membranaceo-marginatae, dorso villis crispatis canescentes et setis nigris plus minus hirtae. Flosculi flavi. Achaenia (immatura) apice leviter attenuata, striata. Pappus niveus, capillaceus, scabriusculus. Clinanthium glabrum.

Inventa in montibus Dschabyk, d. 10
Julii m.

β *simplex*: scapis simplicissimis monocephalis; foliis villosiusculis, aliis integerrimis, aliis dentatis v. runcinatis.