

3. **Daphne orogenes**, Gdgr.

Humilis, 20-25 cent. alta, ramis purpurascens, laxis, denudatis; foliis oblongis, 12 mill. longis, apice obtusis haud aut vix emarginatis sed aperte mucronulatis; bracteis obovato-truncatis; floribus 11 mill. longis, foliis dimidio superantibus; corolla 7 mill. diam. lata, lobis obovato-ellipticis apice subrotundatis, dorso glabris; calycis tubo extus subglaberrimo.

Hab. in *Pyrenæis centralibus* : *Heas (Bordère)*.

Ob flores extus fere omnino læves nec tomentellas, hæc forma ab omnibus hujus gregis speciebus, eximie discedit.

4. **Daphne alpestrivaga**, Gdgr.

Suffrutex 25 cent. altus, ramis denudatis, parce foliosis, cortice obscure purpureo-cinerascente; foliis oblongis 3 mill. latis, 15-17 mill. longis, apice breviter attenuatis mucronulatis; bracteis obovato-acutis; floribus 9 mill. longis, foliis paulò superantibus; corollæ lobis obovato-obtusiusculis, dorso villosis; tubo calycis extus hirtello.

Hab. in alpebus *Delphinatus*.

Quædam supra descriptæ species cum *D. Verloti* Gren. et Godr. *fl. de fr.* III, p, 59, cujus specimina authentica examinare potui, maximam habent affinitatem, sed ab ea corollarum necnon bractearum forma, corticis vetusti colore, præsertim distinguuntur.

5. **Crepis oxyphylla**, Gdgr.

Caule fere omnino subgleberrimo; foliis omnibus angustissime oblongo-lanceolatis, acuminatis, dentatis, haud runcinatis 6 mill. latis; ramis pedicellisque basi bracteis elongatis, filiformibus mire obductis.

Hab. in *Galliâ occidentali* — *Vendée* : *Luçon* (abbé Guinand).

Foliorum et bracteis floriferis forma a sequentibus conspicue diversa, omnes ad gregem *C. pulchræ* L. sp. 1134, spectantes.

6. **Crepis trichosticta**, Gdgr.

Caulibus omnino valde glanduloso-hirtellis; foliis oblongis apice parùm attenuatis, basi attenuatis, amplexicaulibus villosis, saturate virentibus, serratis haud runcinatis, 21-24 mill. latis; foliorum auriculis erectis, triangulari-acutis.

Hab. in *Pedemontio*; *Vallée d'Aoste* (Thomas, plant. exsicc.)

7. **Crepis Vendæana**, Gdgr.

Caule ad $\frac{1}{4}$ part. infer. villosus, superne glabro; foliis anguste oblongo-lanceolatis sat acutis, basi paulo attenuatis, villosis, amœne virentibus, 11-13 mill. latis, subintegerrimis, amplexicaulibus; auriculis vix perspicuis, subrotundatis.

Hab. in *Galliâ occidentali*. — *Vendée*; *Luçon* (abb. Guinand.).

A præcedente foliis duplo angustioribus acutioribusque, habitu magis rigido etc., differt.

8. **Crepis cichoroides**, Gdgr.

Caule usque ad dimidiam infer., partem villosus; foliis late oblongis, apice attenuato-obtusiusculis, basi attenuatis, pubescentibus, pallide viridibus, 20-23 mill. latis, inferioribus mediisque caulinis runcinato-pinnatifidis, superioribus autem valde dentatis, sessilibus, haud aut vix amplexicaulibus; auriculis nullis.

Hab. in sabulosis *Delphinatus* circa *Grenoble* (*Chavanis* ! *Cornet* ! *Verlot* ! *David* ! *Chabert* ! etc. et ipse).