

Hab. in Rossia media [Volhynia (BESSER, EICHW.) et australi [Kiew (TRAUTVETT. *in litt.*), Podolia (BESSER, EICHW.), pr. Astrachan! (BLUM *pl. exs.*)], in Tauria! (PALL., M. a BIEB.) et provinciis caucasicis (M. a BIEBERST.) [Ossetia (C. KOCH), Iberia! (WILHELMS *pl. exs.*), Mingrelia et Imeretia! (NORDMANN *pl. exs.*, C. KOCH), Somchetia! (EICHWALD), versus m. caspium (C. A. MEYER), pr. Lenkoran (HOHENACK), in ins. Sara m. caspii! (KIESERITZKY *pl. exs.*)]. ☉.

Crepis echioides (LEDEB. *Ind. sem. h. dorpat.* 1821, p. 23), quam a. 1818 in Tauria ad monasterium St. Georgii fere defloratam legi, hujus videtur forma major et hirsutior, caule stricto, superne paniculato-subcorymboso.

5. *B. foetida* (DEC. *Fl. franc. IV*, p. 42) caule erecto foliato ramoso cum foliis hirsuto, foliis runcinato-pinnatifidis; summis lanceolatis basi profunde incisus, pedunculis ante anthesin nutantibus, involucri toto caescente villosa: pilis simplicibus glanduliferisque.

Crepis foetida. L. Sp. 1133.

Anisoderis foetida. FISCH. et MEYER *Ind. IV. sem. h. petropol.* p. 32.

β. foliis minus divisus. FISCH. et MEYER l. c.

Barkhansia Candollei. SPRENG. *Syst. veg. III*, p. 652 (ex FISCH. et MEYER).

Barkhansia Candollei. DEC. *Prodr. VII*, p. 158.

Barkhansia glandulosa. DEC. *Prodr. VII*, p. 158.

Crepis glandulosa. AUCT. (ex FISCH. et MEYER).

Hab. in Rossia australi [circa Odessa (BESSER ex DEC.)]. ☉.

592. *Crepis*. L. (excl. spec.).

DEC. *Prodr. VII*, p. 160. — ENDLICHER *gen.* p. 500. — MEISNER *gen.* p. 236. — *Comment.* p. 144.

Capitulum multiflorum. Involucrum duplex; interius uniseriale; exterius breve calyculiforme v. subimbricatum. Receptaculum epaleatum. Achenia teretiuscula, exalata, sensim in rostrum breve attenuata. Pappus pilosus, albus, mollis, multiserialis.

Sect. I. *Phaeccasium*. REICHENB. *Fl. exc.* p. 257. —
DEC. *Prodr. VII*, p. 160.

Capitulum pauciflorum. Involucri squamae exteriores adpressae.

1. *C. pulchra* (L. Sp. 1134) caule erecto basi simplici apice laxo paniculato, foliis radicalibus dentatis runcinatisve basi attenuatis; caulinis ovato-lanceolatis basi sagittatis dentatis integrisve, involucri cylindraceo, squamis exterioribus paucis acutis brevibus margine scariosis.

C. pulchra. DEC. *Prodr. VII*, p. 160. — M. a BIEB. *Fl. t. c. II*, p. 259. —

C. A. MEYER *Ind. cauc.* p. 58. — HOHENACK. *Enum. Talüs.* p. 41.

Chondrilla pulchra. LAM. *Encycl. méth. II*, p. 77.

Prenanthes paniculata. MÖNCH *Meth.* p. 534.

Prenanthes hieracifolia. WILLD. *Spec. pl. III*, p. 1541.

Prenanthes pulchra. DEC. *Fl. franc. IV*, p. 7.

Prenanthes viscosa. BAUMGART. *Fl. transylv. III*, p. 44.

Jntybellia pulchra. MONN. *Ess.* p. 79.

Phaeccasium lampsanoides. CASSINI *in Dict. sc. nat. XXXIX*, p. 387.

Lampsana pulchra. VILLARS *dauph. III*, p. 163.

Sclerophyllum pulchrum. GAUD. *Fl. helv. V*, p. 48.

Hieracium pulchrum. J. BAUH. *Hist. II*, p. 1025.

R. III, 4. p. 1215. — JUNDZ. *Fl. lithuan.* p. 235. — MART. *Fl. mosq.* p. 138. — BESSER *Enum.* p. 31, Nr. 1014. — LUCÉ *Fl. osil.* p. 264. — HÖFFT *Cat. Kursk.* p. 50. — EICHW. *Skiæse* p. 149. — WEINM. *Fl. petropol.* p. 76. — FLEISCH. et LINDEM. *Fl. d. Ostseeprovinz.* p. 274.

C. muricata. GILIB. *Fl. lithuan. III*, p. 231. — Ej. *Exerc. phytol. I*, p. 186.

Hab. in Russia media [Petropoli (GORTER, FALK, WEINM.), ins Osilia (LUCÉ), Livonia! et Curonia! (FLEISCH. et LINDEM.), Lithuania (GILIB., JUNDZ., EICHW.), Volhynia (BESSER, EICHW.), Kursk (HÖFFT), Twer (FALK), Mosqua (STEPHAN, MART.), Kasan (KORNUCH-TROTZYK *in litt.*)] et australi [Kiew (TRAUTVETT. *in litt.*), Podolia (BESSER), ad Tanain (HENNING)]. ☉.

Sect. IV. *Intybelloides.* DEC. *Prodr. VII*, p. 164.

Involuerum biseriale, basi calyculatum. Achenia columnaria. Capitula cylindracea. Scapus subpolycephalus.

9. *C. Gmelini* (FRÖL. in DEC. *Prodr. VII*, p. 164, non SCHULTZ) scapo aphylo, foliis spathulato-oblongis sinuato-dentatis sublyratis glabriusculis, capitulis corymbosis, involucri cylindracei nigricantis squamis pilis articulatis subglanduliferis obtectis; interioribus apice recurvatis; exterioribus longitudine inaequalibus subimbricatis, pedunculis squamatis apice albo-villosis et pilis glanduliferis hispidis, pappo acheniis sesquilingiore.

C. multicaulis β. ochotensis. DEC. *Prodr. VII*, p. 165.

Hieracium Gmelini. L. SP. 1127. — WILLD. *Spec. pl. III*, p. 1571. — GEORGI *It. I*, p. 228. — FALK *Beitr. II*, p. 233. — GEORGI *Beschreib. d. Russ. R. III*, 4. p. 1212 (excl. pl. europ.).

Hieracium foliis ex sinuato dentatis, caulibus supra ramosis, subnudis, pedunculis hirsutis, unifloris. GMEL. *Fl. sib. II*, p. 23, Nr. 20, t. 8, f. 2.

Hab. in Sibiria altaica ad fl. Tom (FALK), baikalensi (GEORGI) et orientali inter Jakutzk et Ochotzk (J. G. GMEL.), inter Alach-Jun et Ochotzk! (TURCZ. *pl. exs.*) ☉.

Icon GMEL. a cl. FRÖLICH (DEC. *Prodr. VII*, p. 166) etiam ad suam *C. alpestris* var. γ. Gmelinianam incaute citatur.

10. *C. multicaulis* (LEDEB. *Fl. alt. IV*, p. 125) scapo aphylo, foliis spathulato-oblongis sinuato-dentatis lyratis utrinque pilosis, capitulis corymbosis, involucri cylindracei squamis ad carinam pilis articulatis subglanduliferis adpersis; interioribus erectis; exterioribus abbreviatis calyculum formantibus, pedunculis squamatis albo-villosis et pilis glanduliferis hispicusculis, pappo achenium vix aequante.

C. multicaulis. LEDEB. *ic. pl. Fl. ross. I*, t. 36. — DEC. *Prodr. VII*, p. 165 (excl. var. β.). — BUNGE *Enum. alt.* p. 79. — KAREL. et KIRIL. *Enum. pl. Soongor.* Nr. 525.

Hab. in Sibiria altaica ad fl. Tschuja! (FL. ALT.), in desert. soogoro-kirghisico m. Alataù! (KAREL. et KIRIL., SCHRENK *pl. exs.*) ☉.

Antecedenti affinis, sed folia piloso-hispida, capitula duplo minora, involucri squamae minus hispidae ad carinam tantum pilis adpersae marginibus glabrae; exteriores breves non imbricatae et pappus vix achenii longitudine.

11. *C. Pallasii* (TURCZ. *Cat. Baikal.* Nr. 714) scapo subaphylo mono- v. oligocephalo plus minus pubescente et subscabro apice subglanduloso-villoso, foliis pilosiusculis oblongis pinnatifidis v. pinnatifidis: laciniis lanceolatis subdentatis; terminali plerumque elongata,

capitulis solitariis v. paucis (2—5) corymbosis, involucri squamis albiv. nigro-piloso-hispidis; exterioribus subquinis lanceolato-linearibus interiorum dimidium fere aequantibus.

Hieracium croceum. LAM. *Encycl. méth.* II, p. 357. — WILLE. *Spec. pl.* III, p. 1571. — DEC. *Prodr.* VII, p. 168 in nota ad calcem paginae.

Hieracium polytrichum α . Gmelinianum. BUNGE *Enum. alt.* p. 80.

Hieracium foliis pinnatifidis, hinc hastatis, pedunculis longissimis, nudis. GMEL. *Fl. sib.* II, p. 22, Nr. 19, t. 8, f. 1.

β . *pumila*: scapo 1—1½ pollicari folia aequante v. parum superante, involucri squamis exterioribus subaequalibus.

Hieracium crocatum. BUNGE in *herb. Acad. petropol.*

Hieracium polytrichum δ . apricum. BUNGE *Enum. alt.* p. 81.

Hab. in Sibiria baikalensi et transbaikalensi! (TURCZ., SCHTSCHUKIN *pl. exs.*) pr. Selenginsk (J. G. GMEL.) inque Davuria! (TURCZ., TILESIIUS *pl. exs.*);

β . in Sibiria altaica ad fl. Tschuja! (BUNGE). 2.

12. *C. praemorsa* (TAUSCH in *bot. Zeitg.* IX, 1. Ergänzt.-Bl. p. 79) scapo aphylo racemoso, racemo basi composito: pedunculis inferioribus 2—3cephalis; superioribus monocephalis, foliis elliptico-oblongis basi attenuatis denticulatis pubescentibus.

C. praemorsa. FRÖL. in DEC. *Prodr.* VII, p. 164. — CLAUS *Ind. des. in GÖBEL It. II*, p. 288. — TURCZ. *Cat. Baikal.* Nr. 707. — FLEISCH. et LINDEM. *Fl. d. Ostseeprovinz.* p. 273.

C. fistulosa. FISCH. ex BESSER.

Hieracium praemosum. L. Sp. 1126. — GORTER *Fl. ingr.* p. 122. — KALM *Fl. fennic.* Nr. 442. — PALL. *It. I*, p. 179. — GEORGI *It. I*, p. 228. — LEPECH. *It. I*, p. 202. — FERBER in FISCH. *Livl. Zus.* p. 157. — FALK *Beitr.* II, p. 233. — STEPHAN *Fl. mosq.* Nr. 526. — GEORGI *Beschr. d. Russ. R.* III, 4, p. 1211. — M. a' BIEB. *Fl. t. c.* III, p. 534. — JUNDZ. *Fl. lithuan.* p. 237. — MART. *Fl. mosq.* p. 137. — BESSER *Enum.* p. 31. 75, Nr. 998. — LUCÉ *Fl. osil.* p. 419. — LEDEB. *Fl. alt.* IV, p. 128. — EICHW. *Skizze* p. 149. — WIRZÉN *Casan.* Nr. 300. — C. A. MEYER *Beitr. s. Pflanzenk. d. Russ. R.* I, Nr. 123.

Hieracium spicatum. GILIB. *Fl. lithuan.* III, p. 238. — Ej. *Exerc. phytol.* I, p. 101.

Hieracium aphylocaulon hirsutum, floribus spicatis. AMMAN. *ruth.* p. 149, Nr. 210.

Hieracium foliis ovatis, tomentosis, caule nudo, floribus spicatis, luteolis terminato. GMEL. *Fl. sib.* II, p. 32, Nr. 28, t. 13, f. 2.

Geracium praemosum. REICHENB. *Fl. exc.* p. 259.

Intybus praemorsus. FRIES *Novit. Fl. suec.* ed. 2, p. 245. — WEINM. *Tambow.* Nr. 152. — Ej. *Fl. petropol.* p. 77.

Intybellia praemorsa. MONN. *Ess.* p. 79.

Hab. in Rossia septentrionali [Fennia (KALM)], media [a Newa fl. ad m. ural. (FALK), Petropoli (GORTER, WEINMANN), ins. Osilia (LUCÉ), Livonia! (FLEISCH. et LINDEM.), Curonia (FERBER, FLEISCH. et LINDEM.), Lithuania (GILIB., JUNDZ., EICHW.), Volhynia (BESSER, EICHW.), Mosqua (STEPHAN, MART.), Tambow (WEINM., C. A. MEYER), Pensa! (JACQUET *pl. exs.*), Simbirsck (PALL., LEPECH.), Kasan (WIRZÉN), Orenburg (CLAUS)] et australi [Kiew (TRAUTVETT. in *litt.*), Podolia (BESSER)], in provinciis caucasicis [pr. Georgiefsk! (WILHELMS *pl. exs.*), in m. Beschta (M. a' BIEB.)], Sibiria uralensi (J. G. GMEL.) ad ripam fl. Ural (AMMAN), pr. Slatoust (NESTEROFSKY), in provinc. Iset (FALK), altaica! (J. G. GMEL., FL. ALT.), pr. Krasnojarsk (TURCZ. in *litt.*), baikalensi (J. G. GMEL., GEORGI, TURCZ.) et orientali ad fl. Amga et Aldan (J. G. GMEL.) inque Davuria (TURCZ.). 4.