

*Lactuca montana* purpuro-caerulea minor. *Morison.*

III. Sect. 7. Tab. 3. fig. 23.

h. in fossa diaboli prope Wehrda. Perennis.

*viminea* L. caule ramosissimo virgato: ramis foliaceis albidis glaberrimis: foliis ramorum lineari-lanceolatis basin versus dorso cauli adnatis: lateribus liberis ramis adpressis: floribus subsessilibus axillaribus.

*Lactuca perennis* caule foliis obducto. *Morison* III.

P. 58. Sect. 7. Tab. 6. fig. 20.

Radix descendens fusiformis. Caulis erectus tripedalis glaber: rami alterni erecti teretes levissimi. Folia ima petiolata runcinata glabra: laciniis linearibus dentatis: ramea lineari-lanceolata ad basin subdentata integrave. Flores axillares et terminales terni. Corollulis quinis flavis subtus rubellis. Pericarpia nigra.

h. H. Perennis.

Figuram malam *Allione in Fl. Pedem. Tab. 52. fig. 2.* dedit.

*paniculata*, caule striato piloso superne paniculato: foliis radicalibus petiolatis sinuato-lyratis: caulinis semiamplexicaulibus hastatis basi dentatis: summis lanceolatis: corollulis flavis. *Crepis pulchra* Linn. *Rhezii obs. 1. p. 24.*

h. H. Annuæ.

### CREPIS. *Species Linnaei.*

Flores hermaphroditæ. Calyx oblongus polyphyllus foliolis aequalibus multiflorus, basi squamis foliaceis patentibus calyculatus. Pericarpia libera oblonga striata pappo deciduo pericarpis brevioribus.

*varia*, calycibus carina nigro-pilosis: foliis lanceolatis basin versus dentatis runcinatis: supremis lanceolatis. *Crepis tectorum* Linn. *Icon. Oederi. Tab. 501.*

Variat  $\beta$ . caule subnudo ramosiore, brevioraque foliis superioribus hastatis.

h. in

h. in pratis copiose  $\beta$ . abunde in agris et viis. Annuæ.  
*biennis* L., foliis runcinato-pinnatifidis scabris, basi  
 superne dentatis: calycibus carinatis muricatis: caule tripedali  
 altiorique.

h. in pratis, prope *Cosfelden* et *Sterzhausen*. Biennis.  
*tomentosa*, calycibus basi albo tomentosus: foliis radi-  
 calibus pinnatifidis supremis linearibus hastatis: caule sub-  
 dichotomo. *Crepis Dioscoridis* Linn.

Hieracium majus Dioscoridis. *Tabernaem. icon. 180.*  
*bona.*

h. H. Annuæ.

*parviflora*, caule erecto tereti ramose glabro: foliis  
 imis runcinato-lyratis ovatis obtusis: intermediis lanceola-  
 to-runcinatis dentatis basi incisis: supremis lanceolatis integ-  
 ris: calycibus levissimis.

Calyces duodecim - sexdecimflori. Corollulis luteis.  
 Planta tota glabra levis.

Crepidem strictam *Scopoli Fl. carn. 2. p. 99. Tab. 47.*  
 pro eadem haberem, nisi folia radicalia in meis perfecta  
 runcinato lyrata, quae in *icone* citata non lyrata sunt expressa.  
*Crepis neglecta* Linn. forte eadem planta: differt calycibus  
 foliisque levissimis.

h. H. Annuæ.

*paludosa*, foliis glabris dentatis: imis petiolatis: supe-  
 rioribus amplexicaulibus: ovato lanceolatis: calycibus pilis  
 nigris obsessis. *Hieracium paludosum* Linn.

Hieracium montanum latifolium glabrum minus. C.  
*Baub. Morison. III. Sect. 7. Tab. 7. fig. 44.*

h. in pratis paludosis, frequens in *der Lummersbach*  
 prope *dem Neubof*, et retro *der Marbach*. Perennis.

## CATONIA.

Flores hermaphroditi. Calyx oblongus calyculatus: fo-  
 liolis calycis lanceolato-linearibus acutis subsquarrosis: folio-  
 lis