

squamis exterioribus scariosis. Willd. Hab. in Apulia. Flor. rubri. ☉

13. *foetida*, fol. runcinato-pinnatifidis hirtis, petiol. dentatis, summis lanceolatis basi profunde incis, calycib. ovatis pilosis angulatis. Willd. Engl. bot. p. 837. Hieracium amygdalas amaras olens. Moris. s. 7. t. 4. f. 4. Hab. in versuris agrorum. ☉

14. *aspera*, fol. amplexicanlibus inferioribus oblongis dentatis, superioribus inciso-dentatis, caule setoso-hispido, calycib. fructigeris angulatis muricatis, squamis exterioribus membranaceis ovatis deciduis. Willd. Hab. in Oriente, Sicilia, Palaestina. Caul. nudus. Cal. torulosus, hispidus, foliis exterioribus ovatis, membranaceis, deciduis. ☉

15. *Iappacea*, fol. sessilibus hispidis oblongis sinuato-dentatis, caule hispido, ramis unifloris, pedunc. incrassatis, calycib. fructigeris angulatis, squamis exterioribus linearibus setoso-hispidis. Willd. p. 1599. Hab. . . Fol., ut caulis, pilis globulosis obsita. W. ☉

16. *virgata*, glabra, caule superne nudo, pedunc. subumbellatis superne squamulosis, lateralibus centrali longioribus, fol. dentatis, inferioribus lato-lanceolatis, pappo sessili simplicissimum. Desf. atl. 2. p. 230. Willd. p. 1600. Hab. in arenosis Barbariae. Cal. tomentosus. ☉

17. *hieracioides*, fol. glabris dentatis, radicalibus ovato-spathulatis, caulibus oblongis sessilibus, corymbo terminali, calycib. glanduloso-hispidis. Willd. Pl. rar. hung. 1. p. 71. t. 70. Hab. in Hungaria. ☉

18. *hispida*, setoso-hispida, fol. runcinatis basi auriculatis, superioribus lanceolatis sagittatis hastatis, basi pinnatifidis, calycib. hispidissimis. Willd. Pl. rar. hung. 1. p. 42. t. 43. Hab. in arvis Pannoniae, Croatiae, Slavoniae et Banatus. Cal. subtomentosi. Pedunc. breves, multiflori. ☉

19. *setosa*, fol. sagittato-amplexicaulibus, dentato-pinnatifidis, summis linearibus: rachi pedunculis calycibusque setosis, caula mosissimo. Hab. in monte St. Bernhardi et in alpi. Rhaeticis. Cal. squamae glabrae, hispidae, exteriores patulae. Pedunc. biflori, clongati. Prioris var. ?

20. *puugens*, fol. oblongis laciniatis glabris, rachi cauleque setoso-hispido, flor. subcorymbosis: nonnullis subsessilib., calycib. muricatis subfarinosi. H. P. Hab. . . Pedunc. subdichotomi. Flor. intermediis subsessiles.

21. *nicaeensis*, fol. runcinato-pinnatifidis,

piloso-scahris, caul. paniculato, squamis: calycinis carinato-caliculatis pubescentibus, pappo sessili. Balb. (ined.) Hab. circa Nicaeam. Pedunc. juniores tomentosi. Fol. rachi praesertim setosa, caulina amplexicaulia.

22. *tectorum*, fol. lanceolato-runcinatis sessilibus laevibus, inferioribus dentatis, caulibus hastatis, summis linearibus margine revolutis. Flor. dan. t. 50r. Hab. in aridis, tectis. ☉

\* *cinerea*, fol. lanceolatis: inferioribus integris dentatis glabris, caulibus lanceolatis amplexicanlibus, caul. sulcato-ramoso, flor. corymbosis, cal. piloso-farinosi. C. tectorum. Vill. delph. 3. p. 144. Hall. enum. p. 750. n<sup>o</sup>. 2. Hab. aestate in agris, in ruderatis, graminosis. Caul. basi pilosus ibique rubicundus, ultra 2-pedalis, plerumque subsimplex. Cor. inferne rubens. A. C. praecoce quam maxime diversa. ☉

23. *agrestis*, fol. radicalibus lanceolato-runcinatis, caulibus lanceolatis basi dentatis sagittatis, floribus corymbosis-paniculatis, calycibus hirtis. Willd. Hab. in agris, aggregatis et pratis siccis in Hungaria. Planta spontanea sesquipedalis hispida: culta bipedalis et ultra, fere glabra. W. ☉

24. *parviflora*, fol. sagittatis lanceolatis subdentatis inferioribus, runcinatis, cauleque glabris, pedunc. multifloris dichotomis paniculato-corymbosis, calycibus pilosis. Desf. Cat. p. 88. Hab. in Oriente. ☉

25. *biennis*, fol. hispidis runcinato-pinnatifidis, summis sessilibus lanceolatis dentatis carina hispido-aculeatis, calycibus pubescentibus muricatis. Willd. Hab. in pratis, ad vias. Caul. setosus ultra 3-pedalis. Flor. magni Hieracii. ☉

26. *scabra*, fol. runcinatis hispidis, caulibus sessilibus, flor. corymbosis, calycibus tomentosis, exterioribus adpressis. Willd. p. 1603. Hab. in Gallia. Caul. simplex pedalis. Fol. auralia linearibus-subulata, basi subhastata, auricularibus filiformibus. Similis C. bienni. W.

27. *pinnatifida*, fol. glabris sessilibus lanceolatis pectinato-pinnatifidis apice integerrimis, caule erecto-ramoso, calycibus pubescentibus. Willd. Crepis virens. Hoffm. et Thuill. Flor. p. 419? Hab. in cultis et agrorum marginibus ☉

28. *virens*, fol. glabris: inferioribus remote dentatis, superioribus subintegerrimis subsagittatis, caule basi ramoso diffuso, calycibus pubescentibus. Willd. Lapsana capillaris. L. Sp. pl. 1. p. 812. Lobel. ic. 229. f. 2. Hab. in agris. Polymorpha, ☉