

lineari - subulata basi subhastata, auriculis filiformibus. Flores magnitudine C. tectorum corymbosi. Pedunculi albi tomentosi. Calyces tomentosi non muricati. Calyculo adpresso. Similis C. bienni sed folia radicalia obovato-runcinata, Pedunculi et Calyces tomentosi, calyculusque adpressus. Sub nomine C. Dioscoridis accepi, sed ab hac diversissima. W.

*26. CREPIS pinnatifida. W.

C. foliis glabris sessilibus lanceolatis pectinato-pinnatifidis apice integerrimis, caule erecto ramoso, calycibus pubescentibus. W.

Crepis virens. Hoffm. germ. 281. Roth. germ. I. 336. II. 254. Allion. ped. n. 805.

Schlitzblättriger Pippau. W.

Habitat in cultis et agrorum marginibus Germaniae, Italiae. ☉ (v. v.)

Abunde a sequenti foliis pectinato-pinnatifidis apice integerrimis et caule erecto diversa, cui respectu floris similis. W.

27. CREPIS virens.

C. foliis glabris inferioribus remote dentatis, superioribus subintegerrimis subsagittatis, caule basi ramoso diffuso, calycibus pubescentibus. W.

C. foliis runcinatis glabris amplexicaulibus, calycibus subtomentosis. Sp. pl. 1134. Villars delph. 3. p. 142.

Crepis Dioscoridis. Roth. germ. II. 255?

C. caule ramosissimo, foliis glaberrimis teneris, integris et dentatis. Hall. helv. n. 33.

Lapsana capillaris. Sp. pl. 1. p. 812. Gouan. monsp. 418.

Hieracium minus glabrum, foliis eleganter virentibus. Bauh. pin. 127. prodr. 63.

Hieracium minus Dioscoridis. Tabern. 181. Hall. R.

Hieracium dentis leonis folio hirsutum, flore luteo extus purpurascens. Tournef. parif. 99.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 96.

Grüner Pippau. W.

Habitat in Helvetiae, Galliae agris. ☉ (v. f.)

Folia Radicalia lanceolata, obtusa, glabra, subdentata; Caulina lanceolata, hastata, subamplexicaulia, integerrima, acuta, parva. Caules spithamaei, erecti,