

Specimina duo vidi plantae in herbariis perrarae; unum in museo botanico Academiae Imperialis scientiarum; alterum in herbario illi. Steveni.

## § 3.

Eine andere, ausgezeichnete und, wie ich glaube, noch unbeschriebene Art der Gattung *Crepis* hat Herr Prof. von Nordmann in Mingrelien gesammelt und als *Hieracium grandiflorum* mitgetheilt. Fast sollte man vermuthen es könne diese Pflanze die *Crepis grandiflora* Ledeb. fl. ross. II. p. 827 sein, auch ist die Verwandtschaft mit *C. grandiflora* nicht gering; allein die Diagnose am angeführten Orte stimmt mit unsern Exemplaren gar nicht überein, sie scheint vielmehr nach Original Exemplaren der *C. grandiflora* entworfen zu sein. Wie verschieden aber die mingrelische Pflanze von dieser ist, werde ich versuchen in der, hier folgenden Beschreibung nachzuweisen.

## CREPIS PONTICA m.

C. caule simplici subtricephalo pube minuta subramosa adperso pilisque setiformibus hirtis, apice sublanduloso; foliis subglabris subtus ad costam margineque subsetosis, radicalibus oblongis in petiolum angustum attenuatis, dentatis, caulinis anguste oblongis cum rotundata basi sessilibus subdentatis, summis linearibus; calathidiis subcorymbosis ramo elongato nudo fultis subovatis; periclinii subtomentosi pilisque elongatis subhirtis squamis exterioribus erectis reliquis duplo brevioribus; achaeis apice leviter attenuatis; clinanthio scrobiculato setuloso.

(Species modo crescendi *C. grandiflorae* similis, a qua tamen tota herba, praeter summitatem, eglandulosa, foliis radicalibus in petiolum longum gracilem attenuatis, caulinis sessilibus (non sagittatis), clinanthio scrobiculato, scrobiculis margine ciliatis aliisque notis facile distinguitur; — ex clinanthii conformatione ad *C. rigidam* quoddammodo accedit, sed tota facie, indumento atque foliis longe ab illa distat.)

— (Planta pedalis, sesquipedalis, adscendenti-erecta, tota (caulis, folia, rami et calathidia) pube minuta alba incumbente crispata, p. p. ramosa, adpersa, pallide (flavescenti-) viridis. — Caulis firmus, angulatus, basi crassitie pennae columbinae, simplicissimus, praeter pedunculos (ramos floriferos) terminales, pilis longis setiformibus eglandulosis patentibus vel reversis p. p. flexuosis plus minus, imprimis basin versus, hirtus; rami floriferi (pedunculi) monocephali, 2 — 3½ poll. longi, erecto-patuli, striati, sub periclinio non vel modice incrassati, glandulis pedicellatis raris adpersi. Folia illis *C. succisaefoliae* subsimilia, pilis setiformibus elongatis raris (praeter pubescentiam supra indicatam) subtus ad carinam et in margine instructa, radicalia oblonga, acutiuscula, in petiolum longum anguste marginatum sensim attenuata, cum petiolo 4 — 5 poll. longa et apicem versus 40 lin. circa lata, dentata: dentibus acutis acuminatisve saepe reversis; — folia caulina 5, distantia, erecta vel erecto-patula: infimum laminae foliorum radicalium omnino simile, in petiolum brevem

vaginaeformem, caulem semiamplectentem attenuatum, cum petiolo 3 poll. longum, 8 lin. latum, margine dentatum, dentibus distantibus; — caulinum secundum oblongum, sessile et cum rotundata basi semiamplexicaule (non sagittatum vel cordatum), apice acutum, margine dentatum,  $2\frac{1}{4}$  poll. longum, 6 lin. latum; — folium caulinum tertium et quartum antecedenti similia, sed minora sunt ( $1\frac{1}{2}$  —  $1\frac{3}{4}$  poll. longa, 4 lin. lata) et margine subintegerrima; — summum reliquis multo minus, sublanceolatum, acutum, integerrimum, Calathidia lata, multiflora, quoad formam illis *C. grandiflorae* similia, paulo tamen minora. Periclinium nigrescens, pube brevi tomentosum et pilis brevibus glandulosis, pilisque setiformibus longis sordide flavescentibus, in aliis specimenibus raris adpersum, in aliis contra dense hirtum; squamae interiores subaequales, lineari-lanceolatae, acutiusculae, 6 lin. longae; — exteriores duplo triplove breviores, anguste lineares, acutae, erectae, sublaevae. Corollulae flavae, exteriores periclinio fere duplo longiores. Antherae flavae. Stigmata sordide flava. Achaenia immatura vidi, quae illis *C. rigidae* quoad formam et magnitudinem omnino similia sunt, striis 20 notata, caeterum glabra atque laevia. Pappus *C. rigidae* achaenio  $1\frac{1}{2}$  longior. Clinanthium scrobiculatum, scrobiculis margine breviter pilosis.

Hab. in Mingrelia (Nordm.). 2.

#### S. 4.

In dem mittlern Theile des caucasischen Hochgebirges, an der grossen, von Wladikawkask nach Tiflis führenden Heerstrasse und zwar in der Nähe des Posten Kobi, fand ich eine *Crepis* in wenigen, meistens fast völlig verblühten Exemplaren, die mir zwar sogleich als neu erschien, die ich jedoch, in der Hoffnung in den Herbarien bessere Exemplare dieser Art auffinden zu können, unbeschrieben zurück gelegt hatte. Es scheint jedoch, dass diese *Crepis* weder von den frühern, noch auch von den neuern Reisenden gefunden worden ist, und die von mir gesammelten Exemplare mögen bis jetzt die einzigen, in Herbarien existirenden, sein. Da übrigens diese Exemplare jedenfalls vollkommen hinreichen, um die Art sicher zu charakterisiren, so will ich es nicht weiter verschieben, sie bekannt zu machen. Diese neue *Crepis* ist zunächst mit *C. paludosa* verwandt, von der sie sich jedoch durch grössere, breitere, wenig zugespitzte, fast stumpfe Blätter und durch völlig glatte Blütenköpfchen sogleich unterscheidet. Ich nenne sie

#### CREPIS CAUCASICA m.

*C. (Hieracioides) glaberrima*; caule fistuloso erecto (sub-) ramoso; foliis caulinis breviter acutatis (subobtusis) dentatis, inferioribus obovato-oblongis basi attenuatis, mediis late oblongis cordatis amplexicaulibus, supremis anguste oblongis acuminatis basi subsagittatis; periclinii glaberrimi squamis linearibus obtusiusculis, exterioribus triplo brevioribus subsubulatis erectis; achaeniis glaberrimis 10-striatis.

Ad *C. paludosam* certe proxime accedit, a qua tamen foliis multo latioribus breviter