

290. *CREPIS PULCHERRIMA* sp. nova (Sectio *Eucrepis* Boiss., § *Sclerophyllae*).

Annua, 40—60 cm. alta. Caules elati, supra medium corymboso-ramosi, inferne pubescentes, superne nudi, tota longitudine foliati. Folia basalia et inferiora breviter petiolata oblongo-spathulata, runcinato vel lyrato pinnatifida rarissime subintegra, folia superiora integra, oblongo-lanceolata, semiamplexicaulia, ad nervos pubescentia, caeterum glabra. Capitula numerosissima, cylindracea, 6—8 mm. longa, ligulis flavis. Involucri phylla glabra vel parce pubescentia, post anthesin indurata nervo incrassato. Achenia striata, exteriora scabra, interiora laevia, apice parum attenuata, pappi setae achenium subaequantes: ☉.

Hab. in prov. Talysh. Specimina visa: 1. Astrachanskoje, fl. fr. 17—V—10. (Koenig!)—2. Prope Massaly fl. 16—V—16. (Gr!)—3. Olchovka, in fruticetis, fl. 4—V—16. (Gr!).—4. Marushli, in paludosis, fr. 29—V—94. (Lomakin!).—5. Inter Lenkoran et thermas, in silva, fl. 6—V—16. (Gr!).—6. Germatuk, in ripa glareosa fl. Lenkoran-tshaj, fl. 8—V—16. (Gr!).—7. Vel. fr. 9—V—16 (Gr!).

Affinis *C. pulchrae* L, a qua differt: 1) caulibus elatioribus, apice nec ad basin ramosis, 2) aualibus tota longitudine foliatis, 3) capitulis numerosissimis, corymbum latum formantibus et 4) habitatione in silvis et pratis saepe humidis, nec in locis siccis et rupestribus.

Однолѣтникъ, 40—60 см. высотой. Стебли выше середины щиткообразно-вѣтвистые, внизу пушистые, въ верхней части голые, по всей длинѣ облиственные. Прикорневые и нижние листья сужены въ короткій черешокъ, продолговато обратно-ланцетные, струговидно или лировидно зубчато-выемчатые, очень рѣдко почти цѣльные; верхние цѣльные, продолговато-ланцетные, полустеблеобхватывающие, по нервамъ обычно пушистые, но пластинка голая. Корзинки весьма многочисленныя, на тонкихъ ножкахъ, цилиндрическія, 6—8 мм. длиной, съ ярко желтыми язычками. Листочки обертки голые или рѣдко пушистые, послѣ цвѣтенія по нерву губчато-утолщенные. Сѣмянки продольно-полосатыя, наружныя шероховатыя, внутреннія гладкія; къ вершинѣ немного суженныя; щетинки хохолца равны по длинѣ сѣмянкѣ.

Талышъ, низменная лѣсная зона, на лугахъ и по опушкамъ лѣсовъ, очень обычно: 1. Астраханское, цв., пл. 17-V-10. (Кн).—2. Близъ с. Массалы, цв. 16-V-16. (Гр!).—3. Ольховка, въ кустарникахъ, 4-V-16. (Гр!).—4. У Марушли, болото, пл. 29-V-94. (Лм!).—5. Между Ленкоранью и минеральными водами, цв. 6-V-16. (Гр!).—6. Герматукъ, на галечникѣ въ долину р. Ленкоран-чай, цв. 8-V-16. (Гр!).—7. Вель, пл. 9-V-16. (Гр!).

Описываемый здѣсь видъ ближе всего стоитъ къ *C. pulchra* L. и отличается отъ него такимъ образомъ габитуально: 1) высокимъ ростомъ; 2) характеромъ вѣтвления; у *C. pulchra* обычно стебли развѣтвляются пучкообразно отъ самаго основанія, у *C. pulcherrima* нижняя половина стебля невѣтвистая и только верхняя развѣтвляется на значительное количество вѣтвей, что придаетъ всему растенію совершенно ивой габитусъ; 3) листья у *C. pulcherrima* разсѣяны по всему стеблю до самыхъ конечныхъ развѣтвленій, въ то время какъ у *C. pulchra* они собраны розеткой у основанія стебля, а самые стебли часто совершенно лишены листьевъ; 4) многочисленными корзинками, образующими широкое щиткообразное соцвѣтіе и 5) мезофильнымъ характеромъ мѣстообитанія (луга, часто влажные, болота, лѣса и ихъ опушки), въ то время какъ *C. pulchra* настоящій ксерофитъ, особенно охотно растущій на скалистыхъ и щебнистыхъ мѣстахъ.

*C. pulcherrima*, повидному, представляетъ хорошо обособленную географическую древнюю гирѣанскую расу и, несомнѣнно, будетъ обнаружена въ дальнѣйшемъ и въ сѣверной Персіи; весьма вѣроятно, что цитированные Boissier [Fl. orient., III, 847 (1875)] экземпляры *C. pulchra* съ Эльбурса и Шахруда, которые я, къ сожалѣнію, не имѣлъ возможности видѣть, относятся къ нашему виду.

Тифлисъ.

Февраль 1920 г.