

apice paniculato; fol. ovatis subdentatis hirsutis: superioribus amplexicaulib. Lam. enc. 2. p. 367. H. cydoniaefolium. Villars de ph. 2. p. 107. Hab. in Delphinatu in sylvis. Antecedenti valde affine dicitur. Hujus loci quoque videtur *H. macrophyllum*. Schleicher.

75. *ambiguum*, caul. erecto simplici, glabro paucifloro, fol. subpetiolatis ovato-lanceolatis grosse dentatis distantibus, cal. squamis appressis fere glabris, pedunc. apice tomentosis. Schleicher. Hab. in alpib. Caul. versus radicem rubicundus. †

76. *laevigatum*, caule erecto ramoso, fol. oblongo-lanceolatis glabris petiolatis, medio profunde dentatis, flor. paniculatis, basi calycis pedunculisque pubescentibus. Willd. hort. berol. t. 16. Hab. . . . Facie fere *H. murorum*. W.

77. *lanceolatum*, caule erecto simplici, fol. oblongo-lanceolatis dentatis hirsutis sessilibus, flor. subcorymbosis. Willd. Vill. delph. 3. p. 126. t. 30. Hab. in sylvis Delphinatus. □

78. *fruticosum*, caule ramoso fruticoso, fol. oblongis dentatis petiolatis, peduncul. subcorymbosis, calycib. tomentosis. Willd. *H. fruticosum*. H. P.? Hab. in Madera. Pedunc. ramorum apice elongati sub flore incrassati.

1774. CREPIS. *Cal. calyculatus* squamis laxiusculis. *Recept.* nudum. *Pappus pilosus*, substipitatus (candidus.)

1. *bursifolia*, fol. pinnatifidis crenatis, scapo nudo paucifloro. L. Willd. Sp. III. p. 1592. Bocc. mus. 3. p. 147. t. 106 et 112. Hab. in Sicilia. □

2? *nemauensis*, fol. runcinato-lyratis obtusis dentatis, scapo nudo multifloro hispido, calycinis squamis margine membranaceis. Willd. Allion. ped. n. 809. t. 75. f. 1. *Hieracium sanctum*. L. *Andyala nemauensis*. Vill. delph. 3. p. 66. t. 26. Hab. in siccis Galliae australis, Italiae, Palestinae. ○

Obs. Potius distincti generis plantula. *Recept.* pilosum. Sem. marginalia passim nuda et cal. squamis involuta, ex Decand. Flor. 2. p. 38.

3. *leontodontoides*, fol. runcinatis dentatis glabris, scapo nudo multifloro adscendente, calycib. tomentosis, squamis exterioribus adpressis. Willd. Allion. auct. ad fl. pedem, p. 13. Hab. in sylvis Pedemontanis. ○

4. *taraxacifolia*, fol. runcinato-pinnatifidis dentatis hispidis, scapis adscendentibus basi foliosis multifloris, calycibus tomentosis, squamis exterioribus patulis. Willd. Desf. atl. 2. p. 231. Hab. in Barbariae arvis. Fol. radicalia pinnatisido-runcinata. Pappus stipitatus. ○

5. *Apargia*, fol. lanceolato-ovatis dentatis glabris, caulinis linearis-lanceolatis caule angulato inferne scabro, pedunculis calycibusque hispidis. Willd. (*C. Apargioides*) *Hieracium stipitatum*. L. Jacq. austr. 3. t. 293. Hab. in pratis subalpinis Austriae, Salisburgi, Bavariae. Pedunc. nigrescentes. Pappus stipitatus, qui in Hieraciis semper sessilis. W. □

6. *vesicaria*, fol. ovato-oblongis runcinato-dentatis hirtis, caule basi sulcato, flor. corymbosis, bract. calycinisque squamis exterioribus membranaceis scariosis. Willd. Tournef. cor. 35. Hab. in Creta. Radix crassa. Bract. concavae, membranaceae. □

7. *scariosa*, fol. lanceolatis runcinatis hirtis, caule folioso, flor. corymbosis, calycinis squamis exterioribus membranaceis scariosis longitudine calycis. Willd. p. 1595. Culum. eph. 1. p. 238. t. 237. Hab. in Apulia. ○

8. *praecox (rubicaulis)*, fol. scabris, radicalibus lyrato-runcinatis, caulinis lanceolatis amplexicaulibus dentatis subpinna-tifidis, calycib. subtomentosis, flor. corymbosis. Balb. Misc. p. 37. t. 9. *C. taurinensis*. Willd. p. 1595. *G. vesicaria*. Balbis taur. p. 93. *C. taraxacifolia*. Thuill. Paris. p. 409. *C. ruhealis*. Juss. Caul. basi rubicundus. Hab. in collibus, sylvis. Mayo-Junio. ○

9. *alpina*, fol. ovatis cordato-sagittatis amplexicaulibus dentatis, pedunc. elongatis unifloris, calycib. hispidis, exteriorib. membranaceis. scariosis. Willd. Gmel. sib. 2. p. 16. t. 5. Hab. in alpib. Italiae, Sibiriae.

10. *rigida*, fol. rigidis scabris, dentatis, radicalibus obovatis, caulinis sagittatis amplexicaulibus, flor. racemoso-paniculatis, calycibus pubescentibus. Willd. Plant. rar. Hung. 1. p. 18. t. 19. Hab. in montib. apricis Hungariae, Tauriae. □

11. *rigens*, fol. hispidis ovato-oblongis argute et profunde duplicato-serratis, scapo nudo corymboso, calycib. cylindricis glabris, pappo sessili. Willd. Ait. Kew. 3. p. 127. Hab. in ins. Azoreis. □

12. *rubra*, fol. radicalibus runcinato-lyratis, caulinis amplexicaulib. lanceolatis, inferioribus pinnatifidis, calycib. hispidis,

squamis exterioribus scariosis. Willd. Hab. in Apulia. Flor. rubri. ◎

13. *foetida*, fol. runcinato-pinnatifidis hirtis, petiol. dentatis, summis lanceolatis basi profunde incisis, calycib. ovatis pilosis angulatis. Willd. Engl. bot. p. 837. Hieracium amygdalas amaras olens. Moris. s. 7. t. 4. f. 4. Hab. in versuris agrorum. ◎

14. *aspera*, fol. amplexicaulibus inferioribus oblongis dentatis, superioribus inciso-dentatis, caule setoso-hispido, calycib. fructigeris angulatis muricatis, squamis exterioribus membranaceis ovatis deciduis. Willd. Hab. in Oriente, Sicilia, Palaestina. Caul. nudus. Cal. torulosus, hispidus, foliolis exterioribus ovatis, membranaceis, deciduis. ◎

15. *lappacea*, fol. sessilibus hispidis oblongis sinuato-dentatis, caule hispido, ramis unifloris, pedunc. incrassatis, calycib. fructigeris angulatis, squamis exterioribus linearibus setoso-hispidis. Willd. p. 1599. Hab. . . . Fol., ut caulis, pilis glochidibus obsita. W. ◎

16. *virgata*, glabra, caule superne nudo, pedunc. subumbellatissuperne squamułosis, lateralibus centrali longioribus, fol. dentatis, inferioribus lato-lanceolatis, pappo sessili simplicissimum. Desf. atl. 2. p. 230. Willd. p. 1600. Hab. in arenosis Barbariae. Cal. tomentosus. ◎

17. *hieracioides*, fol. glabris dentatis, radicalibus ovato-spathulatis, caulinis oblongis sessilibus, corymbo terminali, calycib. glanduloso-hispidis. Willd. Pl. rar. hung. 1. p. 71. t. 70. Hab. in Hungaria. T.

18. *hispida*, setoso-hispida, fol. runcinatis basi auriculatis, superiorib. lanceolatis sagittato-hastatis, basi pinnatifidis, calycib. hispidissimis. Willd. Pl. rar. hung. 1. p. 43. t. 43. Hab. in arvis Pannoniae, Croatiae, Sclavoniae et Banatus. Cal. subtomentosi. Pedunc. breves, multiflori. ◎

19. *setosa*, fol. sagittato-amplexicaulib. dentato-pinnatifidis, summis linearibus: rachi pedunculis calycibusque setosis, caule ramosissimo. Hab. in monte St. Bernhardi et in alpib. Rhaeticis. Cal. squamae glabrae, hispidae, extiores patulae. Pedunc. biflori, elongati. Prioris var.?

20. *pungens*, fol. oblongis laciniatis glabris, rachi cauleque setoso-hispido, flor. subcorymbosis: nonnullis subsessilib., calycib. muricatis subfarinosis. H. P. Hab. . . . Pedunc. subdichotomi. Flor. intermedii subsessiles.

21. *nicaensis*, fol. runcinato-pinnatifidis,

pilosо-scabris, caule paniculato, squamis calycinis carinato-canaliculatis pubescens, pappo sessili. Balb. (ined.) Hab. circa Nicaeam. Pedunc. juniores tomentosi. Fol. rachi praesertim setosa, caulina amplexicaulia.

22. *tectorum*, fol. lanceolato-runcinatis sessilibus laevibus, inferioribus dentatis, caulinis hastatis, summis linearibus margine revolutis. Flor. dan. t. 501. Hab. in aridis, tectis. ◎

* *cinerea*, fol. lanceolatis: inferiorib. integris dentatis glabris, caulin. lanceolatis amplexicaulibus, caule sulcato ramoso, flor. corymbosis, cal. piloso-farinosis. C. tectorum. Vill. delph. 3. p. 144. Hall. enum. p. 750. n^o. 2. Hab. aestate in agris, in ruderatis, graminosis. Caul. basi pilosus ibique rubicundus, ultra 2-pedalis, plerumque subsimplex. Cor. inferne rubens. A C. praeceoce quam maxime diversa. ♂

23. *agrestis*, fol. radicalib. lanceolato-runcinatis, caulin. lanceolatis basi dentatis sagittatis, florib. corymboso-paniculatis, calycib. hirtis. Willd. Hab. in agris, aggeribus et pratis siccis in Hungaria. Planta spontanea sesquipedalis hispida: culta bipedalis et ultra, fere glabra. W. ◎

24. *parviflora*, fol. sagittatis lanceolatis subdentatis inferiorib. runcinatis, cauleque glabris, pedunc. multifloris dichotomis paniculato-corymbosis, calycib. pilosis. Desf. Cat. p. 88. Hab. in Oriente. ◎

25. *biennis*, fol. hispidis runcinato-pinnatifidis, summis sessilibus lanceolatis dentatis carina hispido-aculeatis, calycib. pubescentib. muricatis. Willd. Hab. in pratis, ad vias. Caul. setosus ultra 3-pedalis. Flor. magni Hieracii. ♂

26. *scabra*, fol. runcinatis hispidis, caulinis sessilibus, flor. corymbosis, calycib. tomentosis, exterioribus adpressis. Willd. p. 1603. Hab. in Gallia. Caul. simplex pedalis. Fol. floralia linearis-subulata, basi subhastata, auriculis filiformibus. Similis C. bienni. W.

27. *pinnatifida*, fol. glabris sessilibus lanceolatis pectinato-pinnatifidis apice integerrimis, caule erecto ramoso, calycibus pubescentibus. Willd. Crepis virens. Hoffm. et Thuill. Flor. p. 419? Hab. in cultis et agrorum marginibus. ◎

28. *virens*, fol. glabris: inferiorib. remote dentatis, superioribus subintegerrimis subsagittatis, caule basi ramoso diffuso, calycib. pubescentibus. Willd. Lapsana capillaris. L. Sp. pl. 1. p. 812. Lobel. ic. 229. f. 2. Hab. in agris. Polymorpha. ◎