

auslaufend und ganzrandig, am Grunde beiderseits mit ein bis zwei schmalen spitzen Lappen (daher pfeilförmig). — Die Pflanze hat eine ausgesprochen zweijährige Lebensdauer; diese, sowie die Kahleheit der Blätter und Stengel, ferner die eigenartige Blattgestalt gewissen hochwüchsigen Formen der *C. capillaris* [L.] Wallr. [= *C. virens* L.] ähnelnd) und die lange gelbe Behaarung der ziemlich breiten inneren Hüllkelchschuppen kennzeichnen die neue Art. — B.

*Crepis quercifolia* Bornm. et Gauba (sp. nov.). — Sectio *Barkhausia*. — Luteae. — Pedunculi virginei erecti. — Boiss. fl. Or. III, 853—855.

Perennis (an radice crassiuscula biennis?); caule elato, subrobusto, 2,5—3-pedali, inferne pilis albidis breviusculis flexuosis obdito, subhirsutis, eglanduloso, superne glabriusculo, a basi ad apicem ramoso et foliato, corymbum longirameum formante, ramis lateralibus inferioribus pedalibus; foliis supra sparsim et breviter pilosulis, subtus praesertim secus nervos densius pilosis; foliis basalibus caulinisque inferioribus eis conformibus ambitu late obovatis, subacutis, 12—17 cm longis et in tertia parte supera 5—6 cm lata subintegra repando-denticulata basin versus angustatis (sed non petiolatis) lobatisque, lobis utrinque 2—3 ovatis porrectis obtusiusculis; foliis caulinis superioribus rameisque sessilibus, amplexicaulibus, auriculatis, ad basin inciso-lobatis (lobis utrinque 2—3), lobo infimo interdum hastatiformiter lanceolato; ramis inflorescentiae ante anthesin erectis et ad basin foliolo parvo lineari suffultis; capitulis mediocribus, ovato-obconicis, infra apicem constrictis; pedunculo longo glabro et in statu fructifero non inflato; involucri phyllis externis, adpressis, triplo quam interna brevioribus, lanceolatis, non hyaline marginatis, viridibus, dorso parce setulosis glabrisve; phyllis internis lineari-lanceolatis (12 mm usque longis), viridibus (non nigricantibus), ad dorsum carinatis et incrassato-induratis, dense pectinatim eglanduloso-setulosis, setulis albidis; acheniis striatulis et sub lente minute rugulosis, in rostrum longissimum (eis duplo longius exeuntibus 17 mm longis), cum pappo (5—6 mm longo) niveo 20—22 mm metientibus.

Keredj, bebaute Stellen (24. VI. 1936; no. 905).

*C. quercifolia* nob. reiht sich im System der *C. Marshallii* (C. A. M.) Boiss. an, der aber (nach der Beschreibung) „pedunculi nigro-glandulosi“ (nicht kahle), „phylla externa oblongo-lanceolata (nicht sehr schmale) membranaceo-marginata“ und „phylla interna glanduloso-nigricantia“, sowie „folia retrorsum dentata vel runcinato-pinnatifida in petiolum longum attenuata“ eigen sind. Die Blattgestalt der neuen Art ähnelt etwas an *Quercus robur*-Blätter, deren obere (breitere) Hälfte nur ganz seicht gelappt sind. In der Tracht erinnert unsere Art an *C. Triasii* Nym. und *C. taraxacifolia* Th. — Auf den Blättern zahlreich *Puccinia praecox* Bub. — B.