

61. LEONTODON ASPERUM ; foliis dentato-pinnatifidis ; scabris , setis utrinque hispida.

Caulis squamosi, subnudi. Calyces hispidi, squarrosi. Semina lævia. Pappus simplex, longe-plumosus.

Alexandriæ.

CREPIS.

62. CREPIS RADICATA ; foliis sinuatis, dentatis, ciliatis, radicalibus ; caulibus prostratis, multifloris.

DESCR. Caulis semispith. prostrati, angulati, hispidi, ramosi ; bractea ad ramorum exitum hastato-lanceolata, hispida. Folia sessilia, tripollicaria, extrorsum latiora, sinuata, dentibus acutis, pilis hispida, ciliata. Calyx setis nigris. Flores flavi.

Circa Pyramides. Arab. *Srægha*, aliis *Haudân*. حوربان

LAPSANA.

63 LAPSANA TARAXACOIDES ; scapis unifloris, decumbentibus ; foliis pinnatis ; pinnis angulato-mucronatis, retrorsum imbricatis.

DESCR. Recept. nudum. Pappus simplex, sessilis. Calyx imbricatim calyculatus, laciniis longioribus, extrorsum carinatis, interne canaliculatis. Semina utrinque alata.

Alexandriæ. Vernalis. Folia *Taraxaci*.

SCOLYMUS.

64. SCOLYMUS HISPANICUS.

DESCR. Flores flavi. Calyx imbricatus, margine membranaceus, acutus, non spinosus. Receptaculum paleaceum. Pappus nullus. Bractea subquinæ, foliiformes, ambientes calycem. Flores extremi inferti laciniis intimis calycis. Folia sinuato-pinnatifida, spinosa, margine venisque albis, decurrentia alis latis, sinuatis, spinosis ; unde totus caulis quasi alatus. Folia radicalia longiora, conferta, basi attenuata. Tota planta lactescens.

Kâhiræ. Arab. *Læhlech*.

CACALIA.

65. CACALIA PENDULA ; caulibus descendentibus, aphyllis ; pedunculis terminalibus erectis.

DESCR. Caulis bicubitales, ramosi, versus apicem sub-trifidi, carnosii, imbricati squamis subulatis, rigidis, ficcis, cauli parallelis, plurium ordi-

(T)

num