

743. *H. collinum*. *D. C. Fl. fr. Sup. n.* 2915. (a)
H. cymosum. *Wild. Sp. 3. p.* 1566. *H. auricula*. *Var. b.*
Marsch. Fl. taur. Sup. n. 1607.—In collibus gramino-
 sis, circa Trapezum. Junio florens. ☞

744. *H. foliosum*. *Wild. Sp. 3. p.* 1589. *Marsch.*
Fl. taur. n. 1614.—Passim in lazaret Odessæ. Florens
 julio. ☞

745. *CREPIS nemausensis*. *Wild. Sp. 3. p.* 1592.
Sibth. n. 1615. *Hieracium sanctum*. *Sp. pl.* 1127. —
 In herbidis Tauriæ, circa Theodosiam haud rarè. ☉

746. *C. montana*. Caule erecto basi folioso supernè
 ferè nudo multifloro, foliis radicalibus longissimis pin-
 natifidis, lobis ovatis latis integris, extimo subcordato
 apice rotundato, floribus magnis paucis, squamis caly-
 cinis pubescentibus margine membranaceis.

Affinis præcedenti, satis tamen differt radice perenni,
 foliis radicalibus amplis pinnatifidis, floribus quadruplò
 majoribus.—Frequens in montibus insulæ Coi. Maio flo-
 ret. ☞

747. *C. hispida*. *Wild. Sp. 3. p.* 1601. *Marsch.*
Fl. taur. n. 1624. *Barckausia setosa*. *D. C. Fl. fr.*
n. 2951.—In pascuis Odessæ haud rara. Floret maio. ♂

748. *C. vesicaria*. *Sp. pl.* 1152. (a) *Wild. Sp. 3.*
p. 1594. *Sibth. n.* 1928.

Hieracium Creticum, endiviæ-folio. *Tourn. Cor.* 35.
Gundelsheimer in Herb. Tourn.

Circa Byzantium ad sepes copiosè. Maio floret. ☞

749. *C. angustifolia*. Caule erecto scabro sulcato su-
 pernè ramoso, foliis inferioribus sinuatis seu pinnatifidis,
 caulinis amplexicaulibus longè et aculé sagittatis dentatis
 angustissimis, summis linearibus integris, floribus nu-

merosis paniculatis, pedunculis calycibusque nigricantibus hispidis, pappo piloso sessili.

Passim in pascuis Tauriæ, circà urbem Kerch. Floret maio. ☉

750. *C. Dioscoridis*. *Sp. pl.* 1133. *Sibth. n.* 1939. Ad latus vulcani novæ Camini, propè Theram. Floret maio. ☉

751. *C. parvi-flora*. *Desf. Cat. p.* 88. *Persoon. Syn.* 2. *p.* 376.—In arvis insulæ Astypalææ; florens maio. ☉

752. *C. ramosissima*. Caule erecto scabro supernè ramosissimo, foliis caulinis scabris auriculatis linearibus longis, pedunculis multotiès dichotomis sub flore vix pubescentibus, floribus minimis numerosissimis, squamis calycinis dorso ciliatis, pappo piloso sessili.

C. angusti-foliæ proxima; sed discernitur floribus multò magis numerosis et duplò minoribus, foliis angustioribus, necnon pedunculis calycibusque tantùm hirtis nequaquàm nigricantibus.

In pascuis insulæ Berezen, antè fluvium Borysthenem. Julio florens. ☉

753. *C. fuliginosa*. *Sibth. n.* 1947?

C. caule patulo hispido basi ramoso, ramis dichotomis paucifloris, floribus parvis plerumque solitaribus, foliis pilosis infernis lyratis seu acutè dentatis, summis amplexicaulibus basi sagittatis subintegris, calycibus atratis villosis vix calyculatis.

Planta interdùm caule erecto simplici atque glabriusculo. Tùm folia caulina dentata seu pinnatifida.

Ad sepes insulæ Meli ubique reperitur. Aprili floret. ☉

754. *C. fœtida*. *Sp. pl.* 1133. *Sibth. n.* 1951. *Barc-*