

Ad Pag.

709. 4. PSORALEA BITUMINOSA. add. β . *angustifolia*.722. 3. DORYCNIUM LATIFOLIUM: foliolis obovatis obtusis, dentibus calycinis subulatis, caule erecto suffruticoso. *W. Sp.**Hab. in Oriente. H. F. intr. 1811.*947. 10. TRAGOPOGON PARVIFLORUM *mih*i: (5-6) calycibus 8-phyllis corollæ radio longioribus, foliis integris strictis, pedunculis æqualibus.*Hab. — — ♂. D. intr. 1800.*ibid. 11. T. DUBIUS *mih*i: (8-9) calycibus 8-phyllis corollæ radium æquantibus, pedunculis glabris superne incrassatis, foliis integris strictis linearî-subulatis.*Hab. — — ♂. D. intr. 1812.*757. 1. LEONTODON TARAXACUM, add. β . *Lin.*766. 62. HIERACIUM CORONOPHOLIUM *Bernhardi*? (58-59) caule erecto folioso simplici, foliis linearî-lanceolatis basi argute sinuato-dentatis, corymbo paniculato.*Hab. — — ♀. D. intr. 1809.*

767. 43. CREPIS RAPHANIFOLIA: (5-6) foliis radicalibus lyrato-pinnatis: pinnis inæqualiter angulato-runcinatis, squamis calycis exterioribus membranaceis.

*Hab. — — ♂. D. intr. 1813. ex horto berol. sub hoc nomine.*772. 5. HEDYPNOIS TUBÆFORMIS *Tenore*: foliis oblongis amplexicaulibus subintegerrimis margine ciliatis, squamis calycis fructigeris hispidis.*Hab. in Italia. ☉. D. intr. 1814.*