

nuatis cæterum glabris lucidis lætè virentibus irregulariter et remotè dentatis dentibus brevibus triangularibus acutis, caule tenui erecto folia multò superanti superne dichotomè 2-4 cephalo pedunculis longis rectis parcè lineari-squamulosis, foliis caulinis 1-2 longè et angustè linearibus integris, capitulis mediocribus, involucri brevissimè farinoso-tomentelli squamis accessoriis paucis triplo brevioribus linearilanceolatis phyllis nigricantibus linearibus obtusiusculis angustè albo-marginatis, ligulis pallidè flavis concoloribus involucri sesquolongioribus, acheniis subangulatis multistriatis utrinquè vix perspicuè attenuatis pappo niveo pauciseto eis paulò longiori terminatis exterioribus subincurvis.

Hab. in rupibus montis *Athonis*. (Aucher N° 3277, Friw.)

Folia cum petiolo ferè tripollicaria 4-6 lin. lata, caules 10-12 pollic., capitula magnit. *Leont. hastilis*. Species distinctissima ex affinitate *Cr. crocifoliae* Boiss. et Heldr. quæ differt foliis angustissimis integris, acheniis lævibus apice valdè attenuatis, etc.

CREPIS RAULINI Boiss. (Sect. *Eucrepis*.)

Cr. perennis tota setis sparsissimis glanduliferis parcè obsita, rhizomate incrassato duro cæspitoso, foliis omnibus radicalibus viridibus oblongis in petiolum attenuatis parcè et remotè repando-denticulatis, scapis monocephalis folia paulò superantibus squamis paucis setaceis obsitis, capitulis mediocribus, squamis accessoriis paucis lineari-setaceis adpressis involucri dimidiò brevioribus, involucri phyllis angustè linearibus acutis præter pubem sparsam brevissimam farinaceam setulis glandulosis paucis obsitis, ligulis flavis concoloribus involucri vix sesquolongioribus, acheniis..., pappo niveo.

Hab. in *Cretâ* undè retulit et mihi comm. cl. Dr. Raulin.

Planta mihi ex unico specimine nota specimina parva *Seriolæ lævigatæ* quodammodò referens, folia pollicem aut paulò ampliùs longa 4-5 lin. lata acutiuscula acutè breviter et parcè dentata, scapi radicales bipollicares, capitula magn. *Cr. divaricatæ* cui accedit sed a quâ distinctissima.

CREPIS ELBRUSENSIS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Hieracioides*.)

Cr. rhizomate filiformi nudo, foliis rosulatis confertis pilis albis