

Cr. quarta. Lachenal in act. helv. 9. p. 281. n. 9.?

In Caucasi orientalis incultis prouenit. Floret Junio, Julio. ☽

Facies Cr. viridis, itidemque ramosa et patula. Differt foliis scabris margine carinatique ciliato-hispidis: dentibus hand elongatis, calycinis squamis carinâ subspinulosis. Flores parti, sicut in Cr. viridi. Pappus pilosus sessilis.

1624. CREPIS hispida.

Cr. setoso-hispida, foliis runcinatis basi auriculatis: superioribus lanceolatis sagittato-hastatis basi pinnatifidis, calycibus hispidissimis. Linn. ed. Willd. 3. p. 1601. Waldst. et Kit. ranlung. I. t. 43.

Crescit in incultis et agrestibus ad flumen Terek, inter Kisiliar et Mosdok. Floret Mayo, Junio. ☽

Planta, sicut affines complurimae, foliis magis minusque dissectis ludens, insigni caulis, foliorum, imprimis vero pedunculorum et, calycium hispiditate dignoscenda. Flores magnitudinis inter Cr. biennem et tectorum mediae. Pappus pilosus sessilis.

1625. CREPIS rhoeadifolia.

Cr. foliis runcinato-pinnatifidis amplexicaulis: lobis inaequalibus oblongis angulato-dentatis, extimo cuneiformi trilobato, caule ramofo; pedunculis calycibusque hispidis.

Habitat in Iberia. D. Steuen.

Caulis profunde sulcatus: ramis floriferis alternis foliosis. Folia magna lata dissecta et lobata fere Papaveris Rhoeados piloso-pubescentia. Pedunculi et calyces valde hispidi. Flores magnitudine Cr. foetidae. Squamae subulatae laxae ad basin calycis. Corollulae luteae. Pappus pilosus sessilis.

1626. CREPIS pulchra.

Cr. foliis caulinis cordato-sagittatis acuminatis dentatis, panicula composita subcorymbosa nudâ, calycibus subcylindricis glabris: squamis baseos breuissimis.