

brevibus densè hirtis abbreviatis petiolatis lyrato-pinnatipartitis segmentis subretrorsis oblongis triangularibusve parvis iterum sæpè argutè pinnatilobatis integrisve-terminali majori oblongo argutè et remotè denticulato obtusiusculo breviter mucronato, caulis glabris folia 2-3 plò superantibus semel vel bis divaricatim bifurcis præter squamu-lam linearem ad dichotomiam sitam nudis, capitulis mediocribus pendunculo longo supernè nigro-glanduloso suffultis, calyculi squamis ovato-oblongis acutiusculis involucro triplò brevioribus, phyllis lives-centibus præter pubem brevissimam farinaceam secùs lineam medium glanduloso-setulosis, ligulis flavis concoloribus involucro sesquilon-gioribus, acheniis rectis cylindricis 12-15 striatis obsoletè attenuatis pappo niveo caduco eis breviori superatis.

Hab. in loco *Char Gerdene* dicto propè pagum *Asadbar* in parte occidentali montis *Elbrus* Kotsch. № 471, Aucher № 4855. Huc quoque spectare videtur Kotschy № 676 e monte *Totschal* (forma major).

Folia rosulata pollicem vel sesquipollinem longa, caules 3-4 pollicares, capitula magn. *Cr. Bithynicæ*, involuci phylla 4 lin. longa. Ex affinitate *Cr. heterotrichæ* et *Bithynicæ*.

**CREPIS ROBERTOIDES** Boiss. (Sect. *Hieracioides*.)

*Cr. rhizomate cæspitoso petiolis vetustis valdè squamoso, foliis sub lente parcissimè puberulis vel omnino glabris omnibus radicalibus cæspitosis linearibus interruptè pinnatipartitis rachide angustè linearis planâ segmentis triangularibus vel linearis-oblongis acutis sæpè subretrorsis valdè inæqualibus terminali oblongo acuto, caulis numerosis scapiformibus monocephalis folia duplò superantibus squamulâ una alterave setacea obsitis, capitulis minutis, squamis accessoriis paucis angustè linearis-lanceolatis adpressis involucro triplò brevioribus, involuci phyllis parcè et brevissimè farinoso-puberulis livescentibus linearibus acutis, ligulis flavis subtus rubellis involucro sesquiongioribus, acheniis subangulatis multistriatis rectis utrinquè vix manifestè attenuatis pappo sordido eis æquilongo superatis.*

Hab. in regione superiori *Hermonis* suprà *Rascheya* ubi gregariè crescit alt. 8000-9000'. Legi flor. Julio 1846.

Folia cæspitosa flacidula 1 1/2-2 poll. longa laciniis tenuibus 1 1/2-2 lin. longis, scapi 2-2 1/2 pollicares, capitula magnit. eorum *Robertiae taraxacoidis* cuius habitum omnino refert. Species pulchella.